

FOLIT® UNIBOR

40 SL

Čistý
objem: **10 l**
Číslo registrace: 5888

Chemické a fyzikální vlastnosti:
3,1% hm., tj. 40 g vodorozpustný bór v 1 l
pH 3,5 +/- 0,5 (20% vodného roztoku)



CHEMAP AGRO

Pouze pro profesionální použití. Používat pouze v případě skutečné potřeby!
Nepřekračovat doporučené dávkování!

Plodina	Dávkování	Termín aplikace	Počet aplikací
	(l/ha)		
Řepka ozimá	1,0–4,0	Od 4. listu do počátku květu.	1–3
Slunečnice	1,0–3,0	Od 4. listu do počátku květu.	1–2
Obiloviny	0,2–1,0	Od 3. listu do počátku metání..	1–2
Luskoviny	1,0–3,0	Od 4. listu do počátku květu.	1–2
Mák	0,5–2,0	Od 6. listu do počátku květu.	1–2
Cukrovka	1,0–4,0	Po dokončení tvorby listové růžice.	2
Brambory	1,0–3,0	Od počátku dlouhého růstu.	1–3
Zelenina	0,5–2,0	4 týdny až 8 týdnů po výsadbě.	1–2
Réva vinná	1,0–3,0	Od otvírání pupenů až 4. týdny po odkvětu.	1–3
Ovocné dřeviny	1,0–3,0	Od otvírání pupenů do květu, po sklizni.	1–3
Ostatní	0,5–1,0	Vždy při zjištění deficitu bóru, v závislosti na jeho hloubce.	1–2

OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKŮ

Splňuje limity platné v ČR.

ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ

Folit® UNIBor je kapalné, vysoce koncentrované hnojivo obsahující bór snadno absorbovatelný rostlinami. Je určené pro rychlé dodání bóru rostlinám v obdobích zvýšených nároků na tuto živinu. Vhodné zejména pro listovou výživu rostlin náročných na bór, jako jsou řepka, slunečnice, zelenina, ovocné dřeviny a réva vinná, a také cukrovka, mák a brambory. Produkt je směsí kyseliny borité a glycerolu.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ



Koncentraci a množství pracovního roztoku přizpůsobte nárokům jednotlivých plodin a technice postřiku. **Folit® UNIBor** lze kombinovat s POR vyžadujícími nízké pH postřikové jichy. Nabízená doporučení jsou jen všeobecná, lze je modifikovat podle individuálních nároků rostlin a podmínek pěstování. S ohledem na nižší pohyblivost bóru v rostlině je vhodné rozdělit celkovou dávku do několika aplikací. Při dělení aplikací, případně slabším deficitu volíme nižší dávky.

SKLADOVÁNÍ

Hnojivo skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotě +5 až +30 °C oddělené od potravin a mimo dosah dětí a zvířat. Chraňte před přímým slunečním světlem, mrazem a ohněm. Hnojivo je nehořlavé.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY

Do nádrže postřikovače, v 1/2–2/3 objemu naplněného vodou, při zapnutém michadle, přidejte **Folit® UNIBor**. Podobným způsobem přidejte i jiné přípustné a doporučené komponenty roztoku, v souladu s návody na jejich použití. Nádrž doplňte vodou do žádaného objemu a roztok spotřebujte ihned po vyhotovení.

LIKVIDACE OBALŮ A NEPOUŽITELNÝCH ZBYTKŮ

Prázdné obaly od hnojiva, pracovní nástroje a pomůcky vypláchněte dostatečným množstvím vody tak, aby bylo dosaženo minimálně doporučeného ředění hnojiva pro aplikaci. Získaný roztok aplikujte výhradně na ošetřeném pozemku.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. **P201** Před použitím si obstraňte speciální instrukce. **P202** Nepoužívejte, dokud jste si nepřčetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **P308+P313** PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. **P405** Skladujte uzamčené. **P501** Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním

na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Vyčištěný obal bez zbytkového obsahu výrobku odstraňte do tříděného odpadu.

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě, abyste se vyvarovali rizik pro zdraví a životní prostředí.

UFI: 7G10-E084-M00S-2QHW

Obsahuje Kyselina boritá

Datum výroby,
číslo šarže:

Doba použitelnosti:
36 měsíců ode dne výroby.



NEBEZPEČÍ

Výrobce: CHEMAP AGRO s.r.o.,
Dašice 475, 533 03 tel.: 603 848 617,
www.chemapagro.cz



8 594033 600921