

AGITA[®] 10 WG

Reg. číslo CCHLP: Bio 261/D/03/1

Postreková nástraha vo forme vodorozpustného granulátu na ničenie muchy domácej, ktorá sa aplikuje náterom alebo postrekom.

Používa sa vo všetkých objektoch, kde sa mucha domáca vyskytuje, v komunálnej sfére, potravinárstve, zdravotníctve, v objektoch živočíšnej výroby aj za prítomnosti hospodárskych zvierat.

Balenie: 400 g

Výrobok je určený pre profesionálne použitie.

Účinná látka: 10% thiamethoxam (100 g/ kg)
0,05% 2-9 tricosen (0,5 g/ kg)

EC číslo nebezpečnej látky: Thiamethoxam 428-650-4, Xn - škodlivý, R-22-škodlivý po požití

POZOR ! MÔŽE OHROZIŤ ZDRAVIE PO POŽITÍ, NADÝCHÁNÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICAMI ! SENZIBILIZUJE POKOŽKU!

CHRÁŇTE PRED DEŤMI, NEPOUČENÝMI OSOBAMI A HOSPODÁRSKYMÍ ZVIERATAMI:

PRO VČELY JEDOVATÝ

PRE HOSPODÁRSKE, DOMÁCE AVOLNE ŽIJÚCE ZVIERATÁ NEBEZPEČNÝ!

PRE RYBY A OSTATNÉ VODNÉ ŽIVOČÍCHY SILNE JEDOVATÝ!

POUŽÍVAJTE PODĽA NÁVODU!

Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre človeka.

AGITA 10[®] WG je insekticídny prípravok s účinnou látkou novej chemickej skupiny. Nástraha sa aplikuje iba na miesta, ktoré sú muchami vyhľadávané ako sedacie plochy, ako sú okná a dvere a ich okolie, zdroje tepla, časti stien, konštrukcií, technológie apod.. Používa sa aj za prítomnosti zvierat. Aplikuje sa formou vodnej suspenzie postrekom, ručnými alebo motorovými postrekovačmi. Tiež je možná aplikácia natieraním štetcom.

Návod na použitie:

Aplikácia náterom

Dôkladne premiešajte 400 g prípravku AGITA 10[®] WG a 320 ml vlažnej vody tak aby vznikla rovnomerná riedka pasta. Vodu treba pridávať po častiach podľa konzistencie pasty. Toto množstvo postačuje na ošetrovanie budovy s podlahovou plochou 100 m² alebo zodpovedajúcej ploche stien/stropu 200 m². Natrite minimálne 30 plôšok cca 10 x 30 cm tam, kde muchy najčastejšie sadajú (napr. slnečné steny, rámy okien, dojacie potrubie atď.). Takto je potrebné ošetriť cca 2,5 % celkové plochy. Tiež je možné natrieť kúsky kartónu, polyetylénu a tie porozvešovať ku stropu.

Aplikácie postrekom

Dôkladne premiešajte 400 g prípravku AGITA 10[®] WG a 3,2 litra vlažnej vody. Toto množstvo postačuje na ošetrovanie budovy s podlahovou plochou 100 m² alebo zodpovedajúcej ploche stien/stropu 200 m², ošetruje sa asi 30% alebo 60-90 m². Postrekom sa ošetrujú plochy, kde sa muchy najčastejšie vyskytujú.

Odporúčanie pre aplikáciu:

- Do nádoby postrekovača, čiastočne naplnenej vodou, sa za stáleho miešania vsype odvážené množstvo prípravku. Po doplnení vodou na stanovený objem a dôkladnom rozmiešaní je možné AGITA 10[®] WG aplikovať. Ak bola práca prerušená na viac než 30 minút, suspenziu znovu premiešajte.
- Nariedenú suspenziu prípravku AGITA 10[®] WG použite v deň jej prípravy, najlepšie ihneď po jej príprave.
- Neaplikujte na špinavé alebo čerstvo nabielené steny.
- AGITA 10[®] WG je možné aplikovať za prítomnosti zvierat, je však nutné sa vyvarovať priamych zásahov zvierat.

Upozornenie:

Prípravkom je zakázané ošetrovať krmivá a zdroje pitnej vody. Pred postrekom odstráňte nezabalené alebo nezakryté potraviny z miestnosti. Po aplikácii v maštaliach je nutné umyť žľaby, napájačky a plochy určené pre prípravu krmiva, pokiaľ došlo k ich kontaminácii.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Pri práci používajte pokrývku hlavy, ochranný pracovný oblek s protiprašnou impregnáciou, respirátor proti prachu, tvárový štít resp. Ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Zabráňte vdychovaniu riadnym vetraním. Pri aplikácii je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po skončení práce dokonale umyte celé telo, vrátane vlasov, mydlom a teplou vodou. Kontaminovaný pracovný odev pred novým použitím vyperte.

Prvá pomoc:Pri nadýchaní

Opustite zamorený priestor, postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri požití

Po požití prípravku vypláchnite dôkladne ústa vodou, vypite 0,3 litra vlažnej vody a nevyvolávajte zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc!

Pri zasiahnutí očí

Vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 15 minút a vyhľadajte lekára, ak začervenanie očí pretrváva.

Pri zasiahnutí pokožky

Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lazára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s pracovníkmi **NÁRODNÉHO TOXIKOLOGICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA** v Bratislave, telefón 02/547 741 66

Skladovanie:

Prípravok skladujte v suchých, chladných a uzamykateľných skladoch pri teplote, ktorá nesmie byť nižšia ako -10 C a vyššia ako +35 C. Skladujte v originálnych, neporušených obaloch, oddelene od potravín, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

Zneškodňovanie obalov a zvyškov prípravku:

Aplikačné zariadenie, použité ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom sódy a opláchnite vodou.

Prázdne obaly nesmiete znovu použiť k iným účelom a po ich vypláchnutí teplou vodou (aspoň 2-krát) a znehodnotení ich odovzdajte do zberu. Voda použitá k výplachu aplikačnej techniky nesmie kontaminovať recipienty povrchových a spodných vôd.

Zodpovednosť:

Užívateľ plne zodpovedá za škody, ktoré boli zapríčinené faktormi, ktoré výrobca nemôže ovplyvniť. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo použitím prípravku.

Výrobca:

Novartis Animal Health Inc., Švajčiarsko

Držiteľ registračného rozhodnutia:

Novartis spol. s r. o., organizačná zložka, Trenčianska 47,
821 09 Bratislava

Balenie: 400 g obal z plastu

Číslo šarže: Uvedené na obale

Dátum výroby: Uvedený na obalu

® je ochranná známka firmy Novartis Animal Health Inc.