

AGROSTIM FORTE

**kvapalný výživový aditív – stimulátor kvality plodov ovocných drevín,
predovšetkým jadrového ovocia**

„Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.“

Minimálny obsah živín:

Obsah celkového dusíka ako N v %	min. 4,0 %
Obsah celkového draslíka ako K ₂ O v %	min. 2,5 %

Zloženie:

65 g dusíka viazaného vo forme peptidov a oligopeptidov (ako N) v litri,
47 g bezchloridového draslíka (ako K₂O) v litri a
8,7 g auxinoidnej látky – kyseliny α -naftyloctovej (NAA) litri.

KLASIFIKÁCIA A OZNAČENIE:

Nepožaduje sa.

- EUH210** Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
- EUH401** Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
- P102** Uchovávať mimo dosahu detí.
- P262** Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
- P270** Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
- P280** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P313** Vyhl'adajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- P301 + P330 + P331** PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
- P305 + P351 + P338** PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P403 + P233** Uchovávať na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú.
- P501** Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.
- Vč3** Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácií a dodržaní návodu na použitie.

Prípravok sa nesmie používať inak než je uvedené v návode!

Balenie: 1, 5, 10 l HDPE fľaše, kanister

Pôsobenie:

Kyselina α -naftyloctová patrí do skupiny auxínov, ktoré sú prirodzenými hormónmi v rastlinách. Ovplyvňuje metabolizmus rastlín a bunkové delenie. Podľa termínu aplikácie táto látka spôsobuje opad nadbytočných plodov. Aminokyseliny, ktoré sú súčasťou formulácie zlepšujú adhezívne vlastnosti a obmedzujú odkvapkávanie prípravku z povrchu plôdikov a listov, podporujú rast a vývoj jablák najvyššej kvality.

Použitie:

Kvapalný koncentrát AGROSTIM FORTE je určený predovšetkým na stimuláciu tvorby vysokokvalitných plodov jabloní. Je možné ho však využiť ako účinný výživový aditív tiež v súvislosti s pestovaním ďalších ovocných drevín. Prípravok AGROSTIM FORTE je roztokovým koncentrátom určeným na prípravu aplikačných roztokov jeho riedením vodou, pričom takto získaný aplikačný roztok je určený na foliárnu aplikáciu. Prípravok AGROSTIM FORTE sa aplikuje v dobe, keď najväčšie plody v ružici majú priemer 10 až 12 mm (max. 14 mm), t.j. asi 10 až 15 dní po odkvete. Najlepší účinok možno dosiahnuť ak sa postrek robí za teplého počasia (min. 16 °C) a pri čo najvyššej vlhkosti vzduchu. Najlepšie je prípravok aplikovať skoro ráno, alebo podvečer. Pre aplikáciu treba voliť čo najjemnejší postrek, aby sa dosiahlo dokonalé zvlčenie listov a plodov. Aplikáciu nie je vhodné realizovať za chladného, alebo príliš teplého počasia.

Na hektár možno doporučiť dávku 4 - 6 litrov (0,4 – 0,6%) prípravku AGROSTIM FORTE, pričom uvedené množstvo je vhodné aplikovať v 1000 až 2000 litroch aplikačného roztoku

(podľa kvality postreku). Nižšiu dávku prípravku 4 - 5 l (0,4 – 0,6%) je vhodné použiť u odrôd: Red Delicious, Kids Orange, Jonathan, Jonagold, Rosen, Spartan, Starkling, Starkrimson, Stayman Red a Summered. V prípade odrôd Cox Orange, Elstar, Golden Delicious, Idared, Maigold, Parména zlatá, Primerouge a Boskopské sa odporúča použiť vyššiu dávku prípravku (5 – 6 l). Prípravok AGROSTIM FORTE je účelne používať v prípade zdravých, dobre rodiacich stromov, ktoré bohato zakvitli a boli tiež dobre opelené. Ochranná lehota prípravku AGROSTIM FORTE je 10 – 14 dní.

Aplikáciu prípravku AGROSTIM FORTE nie je vhodné kombinovať s aplikáciou žiadnych ďalších pesticídov. Do postrekovej kvapaliny nie je potrebné pridávať zmáčadlo, alebo adhezívum. Zložky bielkovinovej povahy obsiahnuté v prípravku zabezpečujú dobrú zmáčateľnosť a príľnavosť prípravku na povrchu listov.

Príprava postrekovej kvapaliny:

Odmerané množstvo prípravku sa za účinného miešania pomaly vleje do nádrže postrekovača naplneného asi do polovice až dvoch tretín vodou. Po dôkladnom premiešaní obsahu postrekovača sa za miešania doplní potrebné množstvo vody.

Bezpečnosť pri práci:

Pri manipulácii s prípravkom a aplikácii používame ochranný odev, ochranný obličajový štít alebo ochranné okuliare, zásteru, gumené rukavice a pevnú pracovnú obuv.

Zachovať základné zásady hygieny a bezpečnosti pri práci a zamedziť kontaminácii kože a očí. Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť. Po práci a pred jedlom umyť si ruky s teplou vodou a mydlom. Dbáť, aby sa prípravok nedostal do očí, chrániť pred nepovolanými osobami a deťmi. Prípravok môže pri náhodnom požití poškodiť zdravie a vyvolať podráždenie zažívacieho traktu s nevoľnosťou, zvracaním a hnačkami.

Po skončení práce je potrebné dôkladne očistiť (na čistenie je vhodné používať vodné roztoky prípravku AGROPUR) používané zariadenie a toto vypláchnuť čistou vodou.

Postrek možno robiť len za bezvetria, alebo len pri miernom vánku tak, aby postrekom neboli zasiahnuté osoby a susedné kultúry.

Prípravok nie je horľavinou. V prípade požiaru možno používať všetky hasiace prostriedky, pričom je však potrebné zabrániť, aby sa zriedený prípravok nedostával do verejnej kanalizácie a aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov spodnej vody a tiež recipientov povrchových vôd. Pri požiarom zásahu je potrebné používať dýchacie prístroje, keďže horením prípravku môžu vznikať aj toxické splodiny.

Prvá pomoc :

Po požití: nevyvolávať zvracanie. Postihnutého čo najskôr dopraviť lekárovi

Po vdýchnutí: pri ťažkostiach po vdýchnutí pár zabezpečiť postihnutému prevoz na čerstvý vzduch. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadať lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: dôkladne umyť mydlom a vodou. Kontaminovaný odev vyzliecť.

Po zasiahnutí očí: vymyť dôkladne dostatočným množstvom vody počas cca. 15 minút. Vyhľadať lekársku pomoc.

V ťažších prípadoch, najmä po zasiahnutí očí, vyhľadať lekársku pomoc. Informovať lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

Skladovanie:

Skladujte v pôvodných, dobre uzatvorených a neporušených obaloch v krytých, vetraných, hygienicky čistých a uzamykateľných skladoch oddelene od potravín, liekov, krmív, dezinfekčných prípravkov, hnojív, horľavín, ako aj obalov od týchto látok.

Doba použiteľnosti pre výrobok skladovaný v pôvodných obalov je dva roky od dátumu výroby.

Zneškodňovanie obalov a zvyškov:

Prázdne obaly odovzdajte na recykláciu do separovaného zberu. Väčšie obaly po dôkladnom vyprázdnení odovzdajte do schválenej spaľovni.

Oplachovú vodu použite na prípravu postrekovej kvapaliny. Prípadné zvyšky postrekovej zmesi vylejte do plytkej ryhy na ošetrovom pozemku. Po skončení práce vypláchnuť nádrž postrekovača vodou, resp. vodným roztokom prípravku AGROPUR.

Prípravok, ani jeho zvyšky a oplachové vody nesmú zasiahnuť zdroje podzemných vôd ani recipienty povrchových vôd.

Asanácia: aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte za použitia prípravku AGROPUR.

CERTIFIKÁT ÚKSÚP-u č.: 879

Výrobná šarža: na obale

Dátum výroby: na obale

Vyrába : ASRA, spol. s r.o. Dodáva : ASRA spol. s r.o. 900 28

Ivanka pri Dunaji, Nádražná ul. 28

Vyrobené na Slovensku !