



BASKUS®

pomocný prostředek pro podporu zdravotního stavu zelenin a brambor proti bakteriózám

Účinná složka: směsná kultura probiotických mikroorganismů (bakterií a kvasinek) BASKUS19

Uložená ve Sbírce mikroorganismů jako CCDM1091

Množství: min. 1×10^7 KTJ/ml

Kultura BASKUS19 je ve výhradním vlastnictví firmy MONAS Technology s.r.o. a nesmí být dále rozmnožována.

Evidenční číslo: 1856-0C

Formulační úprava: rozpustný koncentrát

Držitel rozhodnutí o zápisu do úředního registru a distributor v ČR:

MONAS Technology s.r.o., Plav 122, 370 07 České Budějovice, www.monastechnology.cz

Výrobce: Milcom, a.s., Ke Dvoru 791/12a, 160 00 Praha-Vokovice, Česká republika

Působení: BASKUS® je pomocný prostředek, který dovede podpořit zdravotní stav rostlin napadených patogenními bakteriemi. Každá jednotlivá složka je účinná a společná směs mikroorganismů se stává účinnější s jistějším účinkem na všechny prodiny a široké spektrum potencionálně patogenních bakterií. Kvasinky podpoří přirozenou obranyschopnost rostlin a bakterie vytěsní patogenní bakterie. Účinek proti patogenním G+ i G- bakteriím.

Rozsah a způsob použití:

BASKUS

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
zelenina, brambor	zvýšení odolnosti rostlin	2 l/ha	1	2) bakteriózy	

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
zelenina, brambor	200 – 1000 l/ha	postřik, kapková aplikace, aplikace před výsadbou (včetně máčení kořenů, moření brambor), aplikace při výsadbě	10x	3 – 10 dnů

Doporučení k aplikaci: Za chladného nebo extrémně vlhkého počasí nebo jiných stresujících podmínek se rostliny mohou snadno dostat do stresu, a pak podléhají napadení potencionálně patogenními bakteriemi. Aplikujeme při nástupu stresujících podmínek nebo co nejdříve, když se symptomy objeví. Možný postřik na porost, přidávání do kapénkové závlahy, aplikace na sadbu před výsadbou aj.

Přípravek obsahuje živé speciální kmeny bakterií a kvasinek. Vyvarujte se aplikaci za přímého slunce.

Nekombinovat s fungicidy, s přípravky na bázi: fosetyl-Al, oxidů mědi, morforegulátory, kyselinou citronovou, listovými hnojivy obsahující bór, hnojivy obsahující více jak 10 % obsahu dusíku.

Doba použitelnosti: 2 měsíce od data výroby při dodržení podmínek pro skladování

Skladování: Přípravek **BASKUS®** se skladuje v uzavřených originálních obalech mimo přímý sluneční svit, v suchých, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, dezinfekčních prostředků, a obalů od těchto látek při teplotách +4 °C až 15°C. Přípravek chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním teplých zdrojů.

Balení: kanystr HDPE se šroubovým uzávěrem 5 l, 10 l, 20 l, skleněná láhev se šroubovým uzávěrem 0,5 l

Příprava postřikové kapaliny: Před použitím přípravku důkladně protřepeme. Otevřeme a vlijeme do nádrže postřikovače zčásti zaplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Přípravek se snadno rozmíchává ve vodě.

Čištění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení po ukončení práce vypláchněte čistou vodou. V případě čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití.

Likvidace obalů: Prázdné obaly by měly být recyklovány nebo spáleny ve schválené spalovně.

Informace o první pomoci při zasažení člověka pomocným prostředkem:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. První pomoc při nadýchání: Přejděte mimo ošetřovanou oblast. První pomoc při zasažení kůže: Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlažné čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Pokyny k použití osobních ochranných prostředků pro osoby manipulující s pomocným prostředkem:

Ochrana dýchacích orgánů	není nutná
Ochrana rukou	gumové nebo plastové rukavice
Ochrana očí a obličeje	není nutná
Ochrana těla	ochranný oděv podle ČSN EN ISO 27065 (pro práci s pesticidy – typu C1 nebo C2), popř. celkový ochranný oděv typu 4 podle ČSN EN 14605+A1 nebo typu 6 ČSN EN 13034+A1, označený grafickou značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688, oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice, při máčení sadby používat vhodnou gumovou nebo plastovou zástěru
Dodatečná ochrana hlavy	není nutná

Dodatečná ochrana nohou pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu)

Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba vyměnit

Při vlastní aplikaci, když je pracovník dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy zařízení.

Bude-li použit při aplikaci menší typ traktoru bez uzavřené kabiny pro řidiče nebo při ruční aplikaci, pak část OOPP (používané pro ředění – minimálně ochranný oděv a dále rukavice u ruční aplikace) je vhodné používat i během aplikace.

Označení pomocného prostředku podle § 54a odst. 6 zákona:

Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Zbytky přípravku lze nalít na kompost nebo na hnůj.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Při polní aplikaci se doporučuje použít traktor nebo samojízdný postřikovač s uzavřenou kabinou pro řidiče například typu 2 (podle ČSN EN 15695-1) tj. proti prachu a aerosolu.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Při práci nepoužívejte kontaktní čočky.

Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků.

Po odložení osobních ochranných pracovních prostředků se umyjte. Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Vstup na ošetřený pozemek je možný po zaschnutí postřiku.

Všechny mikroorganismy se považují za možné senzibilizátory.

Tuto pomocnou látku je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Číslo výrobní šarže:

Datum výroby: