

BOROFYT 150

HNOJIVO ES BORETHANOLAMIN

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

ZNAK AKOSTI	HODNOTA
Bor ako B v %	11,0

HMOTNOST BALENIA: 27,6 kg

VÝROBCA: Lovochemie a.s., Terežská 57, Louisec, Česká republika, Tel.: +420 416 561 111

pH zriedeného roztoku (1:5)	7 – 9
Hustota v kg/l pri 20 °C	cca 1,38

Obsah rizikových prvkov:

Hnojivo spĺňa zákonom stanovené limity v mg /kg hnojiva: kadmium 1,0, olovo 10, ortuť 1,0, arzén 20, chrom 50.

Použitie:

Používa sa na preventívne alebo kuratívne odstraňovanie nedostatku využiteľného bóru v rastlinách. Pri kuratívnej aplikácii formou postreku na list odstraňuje fyziologické anomálie spôsobené nedostatkom tohto prvku v rastline. Preventívne sa aplikuje do parastov na miestach s vysokým deficitom bóru. Preventívnu aplikáciu je tiež možné odporučiť pri kultúrach náročných na dostatočnú zásadu bóru. K takýmto náročným plodinám patria: repka, mak, šnečnica, cukrová repa, krmná repa, ovocie, okrasné kvetiny.

Aplikácia:

Najvhodnejšie použite ju na začiatku vegetácie po oľstvení kultúr. Od tejto doby možno hnojivo aplikovať v 14-dňových intervaloch. V dobe kvitnutia hnojivo piazimvo pôsobí na prerastanie pelového vrchu, a tým aj na tvorbu semien a plodov. Hnojivo je možné aplikovať po celú dobu vegetácie.

PLODINA	OBDOBIE APLIKÁCIE	POČET APLIKÁCIÍ	DÁVKOVANIE V l/ha
Repka ozimá	1. aplikácia: na jeseň, BBCH 13 – 14	1	3
	2. aplikácia: na jar, BBCH 30 do buttonizácie	1	3
Cukrová repa	1. aplikácia: po dokončení tvorby listovej ručie	2	3
	2. aplikácia: v 14-dňovom intervale		
Jadroviny, kľosťoviny	1. aplikácia pri otváraní púčikov, 2. a 3. aplikácia v intervale 14 dní	2 – 3	2
Zelenina	3 týždne po výsadbe, 2. aplikácia po 4 týždňoch	2	1
Vínice	1. aplikácia pri otváraní púčikov, 2. pri kvitnutí a 3. pri rastu plodov	3	3
Obilniny ozimné	po skosení zrnja	1	2

Pre aplikáciu platia všeobecné zásady pre foliárnu výživu rastlín, t.j. najvhodnejšia doba pre aplikáciu je pri vyššej relatívnej vlhkosti a nižšej teplotách. Optimálne je skoro ráno, večer alebo pri zatiahnutej oblohe.

20l

OZNÁČENIE PODLA NARIADENIA (ES) Č. 1272/2008 [CLP]:

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI: Žiadne.

SIGNÁLNE SLOVO: Nie je.

STANDARDNÉ VEŤY O NEBEZPEČNOSTI: Žiadne.

POKYNY PRE BEZPEČNÚ MANIPULÁCIU:

P405+P102 Skladujte uzamknuté. Uchovávajte mimo dosah detí.

P403 Skladujte na dobre vetranom mieste.

P201 Uchovávajte oddelene od potravín.

P202 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom.

P305+P351+P338 PRI ZASAHNUTÍ OČI: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné čočky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné ich vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

P302+P352 PRI STYKU S POKOŽKOU: Opláchnite veľkým množstvom vody a mydlá.

P280 Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare.

P314 Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.

DOPRAVA A SKLADOVANIE:

Hnojivo sa dopravuje v PE prepravových nádobách alebo iných obalových jednotkách dohodnutých s odberateľom. Skladuje sa v polyetylénových, sklenených alebo v plovodných obaloch. Teplota výroby pri skladovaní nesmie klesnúť pod 5 °C. Pri balení výrobku sa odaj plnia s presnosťou ± 3 %.

OBJEM BALENIA: 20l

DOBA POUŽITELNOSTI: min. 24 mesiacov pri skladovaní v pôvodných obaloch

Toto hnojivo je možné použiť v ekologickom poľnohospodarstve podľa nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej produkcii a označovaní ekologických produktov.

DODÁVCA:

AGROFERT a.s., organizačná zložka Agrochemia
Nobelova 34, 836 05 Bratislava

DISTRIBÚTOR PRE SR:

BELBA PLUS, s.r.o.

Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Ilave



DÁTUM VÝROBY: