

Dávkování a podmínky používání

Aplikace na list:

| plodina | dávka | poznámka |
|--|---------------------------------------|---|
| Mák | 1/1 ha min. 200 l vody/ha | 1 – 2 aplikace ve stádiu 6 – 8 listů |
| Slunečnice | 3/1 ha min. 200 l vody/ha | 2 aplikace od fáze 5 páru pravých listů do fáze před květem |
| Cukrová řepa | 3/1 ha min. 200 l vody/ha | 2 aplikace na začátku růstu a na dobře zapojený porost |
| Polní brukvo- vitá plodina, řepka olejka | 3/1 ha min. 200 l vody/ha | 1 - 2 aplikace od 2 - 3 listů do začátku květu |
| Luskoviny | 3/1 ha min. 600 l vody/ha | 1 - 2 aplikace od 5 - 6 listů do fáze před květem |
| Ovocné stromy (jadrkový, pec- kovič) | 1-2 l/ha 2/1 ha min. 600 l vody/ha | 2 aplikace za rok 1. Aplikace ve stadiu poupěte 2. Aplikace před opadem listů |
| Jahody | 1/1 ha min. 600 l vody/ha | 2 dávky ve stádiu po odkvetu a po 14 dnech |
| Zelenina | 3/1 ha min. 600 l vody/ha | 1 až 2 aplikace na dobře zapojený porost nebo před a po květu |
| Vinná réva | 2/1 ha min. 500 l vody/ha | Aplikace ve fázích: - objevení květenství; - květenství plně vyvinuté - na konci květu |

Aplikace postřikem na půdu, v dávce: 8 - 10 l/ha, před výsévem nebo sazením.

NÁVOD K POUŽITÍ Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až z povrchu plodiny začne skápat. Vyhněte se postřiku v době silného slunečního záření anebo vysokých teplot 28°C. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy denní teplota překročí 28°C. Velmi mladé listy a plodiny které jsou v stresu můžou být náchylnější k spálení. Za těchto okolností použijte nižší dávku a přiměřeně zredukujte aplikáční interval. Vzdolnove dopravní aplikáční dávky a aplikáčních termínů uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY

1. Nádrž postřekovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení. 2. Přidejte potřebné množství tohoto produktu, a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími látkami v tank-mix, tank produkt přidávejte vždy jako poslední. Nenechte smes stát bez zapnutého mícháče zranění. 3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

hustota: 1,34 kg/l

LIKVIDACE Nevylévajte do kanalizácie; Zneškodňte tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Všet speciální pokyny nebo bezpečnostní list. Kontejner pro vyprázdnění vypláchněte třikrát čistou vodou. Vypalčovací vodu použijte k přípravě aplikáční směsi. Prázdné obaly předvéte do sběru k recyklaci. Prázdný obal nepesalujte a nepoužívejte žádným k jiným účelům

ZREKNUŤ SE ZÁRUKY: Výrobca a dodávateľ tohoto produktu zaručí obsah špecifických účinných zložiek v akceptovateľnej tolerancii pri balení. Nepoukytujú sa žiadna záruka jakéhokoli druhu súvisiacej s použitím tohto hnojiva ani žiadna odpovednosť nebude akceptovaná za škody vyplývajúce zo skladovania, manipulácie alebo jeho používania.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a životního prostředí: Při používání nejedzte, nepijte ani nepoužívejte vodu, ochranný odev, gumové nebo plastové rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabráňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte prach/aerosol. Po práci si omyte ruce a obličej. **První pomoc:** Projevte-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku. **Při nadychnutí prachu/aerosolu při manipulaci/aplikaci:** Přerušete expozici, zadržte těleso i duševní klid. Přetřávejví i dýchací potíže, vyhleďte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. **Při zasažení kůže:** Odložte kontaminovaný odev. Zasažené části pokožky omývejte pokud možno teplou vodou a mydlem, pokožku dobře opláchněte. Při známých slnečných podrážkách vyhleďte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. **Při zasažení očí:** Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči v širokém rozeviených odskok do dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvom vlahe tečúcej vody. Kontaktní čočky nelze znovu použiť, je třeba je zlikvidovať. Rýchlost poskytnutí prvej pomoci při zasažení očí je pro minimalizáciu následků rozhodujúci. **Při náhodném požití:** Ústa vypláchněte vodou (pouze za predpokladu, že postížený je při vedomí a nemá-li kŕče); nevyvolávejte zvracanie. Vyhľadte lékařskou pomoc a ukaže štítok / etiketu/počet. obal hnojiva nebo bezpečnostní list. Při vylhľadání lékařského ošetření informujte lekára o hnojivu, se kterým postížený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V prípade potreby lze ďalší postup pri první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovať s toxikologickým informáčním strediskom: telefon nepretržite: +224 919 293 nebo 224 915 402.

Hnojivo není ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ve znění pozdějších předpisů klasifikováno jako nebezpečná směs.

Nu yždáním je v dispozici bezpečnostní list. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Před použitím si obstarajte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečteli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Zamezte vdečovaniu prachu/dymu/plynu/mlhy/pár/aerosolu. Po manipulácii dôkladne omyte ruce a obličej. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobre vetránnm mieste. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Dávkování a podmínky používání:

Aplikácia na list:

| plodina | dávka | poznámka |
|---|---------------------------------------|---|
| Mak | 1/1 ha min. 200 l vody/ha | 1 – 2 aplikace v štádiu 6 – 8 listov |
| Slnečnica | 3/1 ha min. 200 l vody/ha | 2 aplikace od fázy 5 párov pravých listov do fázy pred kvetom |
| Cukrová repa | 3/1 ha min. 200 l vody/ha | 2 aplikace na začiatku rastu a na dobre zapojený porast |
| Polné kapustovité plodiny, reпка olejna | 3/1 ha min. 200 l vody/ha | 1 - 2 aplikácie od 2 - 3 listov do začiatku kvitnutia |
| Strukoviny | 3/1 ha min. 600 l vody/ha | 1 - 2 aplikácie od 5 - 6 listov do fázy pred kvitnutím |
| Ovocné stromy (jadrkový, kôstko- vité) | 1-2 l/ha 2/1 ha min. 600 l vody/ha | 2 aplikácie za rok 1. Aplikácia v štádiu pučička 2. Aplikácia pred opadom listov |
| Jahody | 1/1 ha min. 600 l vody/ha | 2 dávky v štádiu po odkvetve a po 14 dňoch |
| Zelenina | 3/1 ha min. 600 l vody/ha | 1 až 2 aplikácie na dobre zapojený porast alebo pred a po kvitnutí |
| Viníc | 2/1 ha min. 500 l vody/ha | Aplikácie vo fázach: - objavenia sa kvetenstiev, - kvetenstvo úplne vyvinuté - na konci kvitnutia. |

Aplikácia postřekom na pôdu, v dávke: 8 – 10 l/ha, pred výsievom alebo vysadbu.

NÁVOD NA POUŽITIE Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody až z povrchu plodiny začne škať. Vyhnite sa postřekovaniu v čase silného slnečného žiarenia alebo pri vysokých teplotách vzduchu. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denná teplota je vyššia ako 28°C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylné na spálenie. Za týchto okolností by sa mali používať nižšie dávky a interval aplikácií primerane zredukovať. Pozrite odporúčania pre aplikáčné dávky a termíny aplikácie pre jednotlivé plodiny uvedené na tejto etikete. Určené pre použitie v otvorenom priestore.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KVALPALINY

1. Nádrž postřekovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení. 2. Přidejte potřebné množství tohoto produktu a potom přidejte zvyšok vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími látkami v tank-mix zmesi, tento produkt přidávejte vždy jako poslední. Nenechajte zmes stát bez zapnutého mícháča zariadenia. 3. Po postřeku dôkladne vyčistite a opláchnite postřekovač.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

hustota: 1,34 kg/l

LIKVIDÁCIA Nevylievajte do kanalizácie; Zlikvidujte tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri osobitné pokyny alebo kartu bezpečnostných údajov. Obal po vyprázdnení trikrát vypláchnite vodou. Oplachovú vodu použite na prípravu aplikáçnej zmesi. Prázdné obaly po opláchnutí odovzdajte do zberu na recykláciu. Obal nepoužíajte na žiadny iný účel.

UPOZORNENIE: Výrobca a dodávateľ tohto produktu zaručí, že hnojivo po zabalení obsahuje uvedené množstvo v stanovenej tolerancii. Žiadne záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa použitia tohto hnojiva nebude akceptované rovnako ako nebude akceptovaná žiadna zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia v dôsledku skladovania, manipulácie, aplikácie alebo použitia tohto výrobku.

Bezpečnostní opatření na ochranu člověka a životního prostředí. Při používání nejedzte, nepijte ani nefajčíte. Noste vhodný ochranný odev, gumové alebo plastové rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Nevdechujte prach/aerosól. Po skončení práce si omyte ruce a tvár. **Prvá pomoc:** Ak sa prejaví zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety/štítku alebo príbalového letáku. **Při nadychnutí prachu/aerosolu při manipulaci/aplikaci:** Přerušete expozici, zabezpečte postihnutému teleso i duševný poklid. Ak pretrvávajú potíže s dychaním, vyhľadajte lékařskou pomoc/zabezpečte lékařské ošetření. **Při zasahtnutí pokožky:** Okamžite vyčistite kontaminovaný odev. Časť tela, ktoré boli zasahtnuté hnojivom, okamžite umyte veľkým množstvom tečúcej vody, podľa možnosti aj mydlom. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lékařskou pomoc/zabezpečte lékařské ošetření. **Při zasahtnutí očí:** Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich postihnutý používa. **Při otvorených viečkach** vyplachujte, príjamo pripraviť pod viečkami, čistou vodou možnosť vlažnou tečúcou vodou 10-15 minút. Ak pretrvávajú príznaky (sčervenanie, pálenie) okamžite vyhľadajte lékařskou pomoc (zabezpečte odborné lékařské ošetření). **Při náhodnom požití:** Ústa vypláchnite vodou (iba ak postihnutý nie je v bezvedomí a ak nemá kŕče), nevyvolávejte zvracanie. Vyhľadajte lékařskou pomoc a ukaže tieto etiketu/kartu bezpečnostných údajov alebo príbalový leták. Lekára vždy informujte o hnojive, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom alebo s našou dľa uvedenou 24-hodinovou kontaktnou službou: Národné toxikologické informačné centrum (TIC), Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri akutných intoxikáciách: +421 2 5471 746.

Hnojivo není ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v znění neskorších předpisů klasifikované jako nebezpečná zmes.

Nu požadovanie množstva poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Uchovávejte mimo dosahu detí.

Pred použitím sa obznaníte s osobitnými pokynmi. Nepoužívať, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. Zabráňte vdečovaniu prachu/dymu/plynu/mlhy/pár/aerosolu. Po manipulácii starostlivo umyte ruce a tvár. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Uchovávať na dobre vetránnm mieste. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.