

# FoliaStim® B Mo Liquid

Van Iperen FoliaStim® B Mo Liquid je čisté a vysokokonzentrované tekuté hnojivo s mikroelementmi, pripravené z 15 % morských rias. Náš produkt je stabilným riešením odporúčaným počas vegetatívneho rastu, najmä počas vývoja púčikov, pred kvitnutím. Vysoké hladiny bóru a molybdénu v našom vzorci zlepšujú delenie buniek, vytvárajú bunkovú stenu a pomáhajú rastline pokryť potrebu dusíka. Prítomnosť vysokokvalitných morských rias podporuje príjem a prepravu živín a zvyšuje odolnosť voči abiotickému stresu. Vyrobené v našom závode Euroliquids.



- Prekonáva zaostávajúci vývin, podporuje leguminózu pri fixácii atmosférického dusíka a zvyšuje odolnosť proti suchu a teplu.
- Synergický účinok medzi riasami a živinami
- Vyvinutý pre listovú aplikáciu
- Jemný pre listové tkanivo

## Zloženie:

Bór (B)*	2 % w/w 2.1 % w/v
Molybdén (Mo)*	0.4 % w/w 0.4 %
Extrakt z mor. rias	15 % w/w 16.3 % w/v
Org. látky	2.2 % w/w   2.4 % w/v
Sušina	4.3% w/w

\*Rozpustné vo vode

Ostatné anorganické hnojivo obsahujúce bór, molybdén a 15 % extraktu z morských rias (w/w).

Pred použitím pretrepať. Skladovacia teplota: 5-25°C. Výrobok skladovať v pôvodnom obale. Uchovávať na suchom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia a tepla. Uchovávať mimo dosahu detí a hospodárskych zvierat. Výrobca v žiadnom prípade nebude zodpovedný za akékoľvek následné, zvláštne alebo nepriame škody spôsobené použitím, skladovaním alebo manipuláciou s týmto výrobkom, pretože tieto podmienky sú mimo kontroly výrobcu. Zákazník preberá na seba všetky riziká skladovania, používania alebo uplatnenia tohto výrobku. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste.

Obsah rizikových prvkov a látok neprekračuje limity platné v SR.

## Dávkovanie I Listová aplikácia:

Plodina	Doba aplikácie	L/ha/ apl.*
Repka olejnatá	1- 3 apl.: Od vegetatívneho po opätovný rast, štádium C2 **	2 - 4
Cukrová repa	1- 3 apl.: Od štád. 6 - 8 listov **	2 - 4
Sója	1- 3 apl.: Od 10 cm do začiatku kvitnutia	2 - 4
Slnečnica	1- 3 apl.: Od 3 párov listov, až kým sa neotvorí kvetný púčik **	1.5 - 2.5
Kapusta	1- 3 apl.: Od presádzania **	1 - 2
Dyňa	1- 3 apl.: Pred kvitnutím **	3 - 5
Vínohrady	1- 3 apl.: Od štádia 5-6 listov **	1 - 2
Olivy	1- 3 apl.: Počas 15 dní pred kvitnutím	2 - 3

\* Koncentrácia: 1 – 2 % w/v. | \*\* interval od 10 – 14 dní.

V prípade ošetrenia na list ako súčasť zmesi výrobkov, na ochranu plodín, treba vykonať test znášateľnosti pred prípravou postrekovej zmesi. Uvedené dávky a fázy podávania sú uvedené len ako informácia. Presné dávky, koncentrácia a fáza aplikácie závisia od miestnych podmienok, pôdnych podmienok, použitia iných hnojív a môžu byť dané až po presnej diagnóze.

Čistá hmotnosť 1.09kg | pH 8 +/- 0.5 | Teplota kryštalizácie: 0°C  
Dátum výroby/Číslo šarže: Uvedené na obale  
Doba použiteľnosti: 2 roky

Číslo vzájomného uznania: 1737

Distribútor pre SR: Bacaro s.r.o.  
Lichnerova 89/23, 903 01 Senec

Výrobca: Van Iperen International  
B.V. Smidsweg 24 3273 LK  
Westmaas | Holandsko Tel. +  
31(0)186 578 888  
www.vaniperen.com



Scan this QR code

Pôvod: Holandsko  
Čistý objem:  
1, 5, 10, 200, 1 000 l