

FoliaStim®

Mn Zn Liquid

Van Iperen FoliaStim® Mn Zn Liquid je čisté a vysokokonzentrované tekuté hnojivo s mikroelementmi, pripravené z 15 % morských rias a chelátov EDTA. Náš výrobok je stabilným riešením a odporúča sa aplikovať od skorej jari po tvorbu plodov. Vysoká hladina mangánu a zinku v našom vzorci zlepšuje fotosyntézu a rast nových zdravých koreňov, bujných výhonkov a kvetných púčikov. Prítomnosť vysokokvalitných morských rias podporuje príjem a prepravu živín a zvyšuje odolnosť voči abiotickému stresu.



- Zlepšuje farbu listov, rast koreňa a výhonkov a zvyšuje odolnosť proti suchu a teplu
- Mangán a zinok sú 100 % chelátované a plne dostupné
- Jednoduchá manipulácia a aplikácia
- Vyvinutý pre listovú aplikáciu
- Jemný pre listové tkanivo

Zloženie:

Mangán (Mn)*	1.6 % w/w 1.8 % w/v
Zinok (Zn)*	1.6 % w/w 1.8 % w/v
Extrakt z morských rias	15 % w/w 17.4 % w/v
Organické látky	2.2 % w/w 2.5 % w/v
Sušina	4.3 % w/w

* chelátovaný EDTA a rozpustný vo vode

Ostatné anorganické hnojivo, ktoré obsahuje mangán, zinok a 15 % extrakt morských rias (w/w).

Pred použitím pretrepať. Skladovacia teplota: 5-25°C. Výrobok skladovať v pôvodnom obale. Uchovávať na suchom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia a tepla. Uchovávať mimo dosahu detí a hospodárskych zvierat. Výrobca v žiadnom prípade nebude zodpovedný za akékoľvek následné, zvláštne alebo nepriame škody spôsobené použitím, skladovaním alebo manipuláciou s týmto výrobkom, pretože tieto podmienky sú mimo kontroly výrobcu. Zákazník preberá na seba všetky riziká skladovania, používania alebo uplatnenia tohto výrobku. Ďalšie informácie nájdete v bezpečnostnom liste.

Obsah rizikových prvkov a látok neprekračuje limity platné v SR.

Dávkovanie I Listová aplikácia:

Plodina	Doba aplikácie	L/ha/apl.*
Obilniny	1- 3 apl.: 1- 3 apl.: Od konca odnožovania až predĺžovanie stoniek. Interval 10-14 dní.	2 - 4
Kukurica	1- 3 apl.: Počas fázy 4-8 listov.	2 - 4
Zemiaky	1- 3 apl: 3 týždne po vyklíčení. Interval 7-10 dní	2 - 4
Zelená fazuľa	1- 3 apl.: Od fázy 3 troj-listov. Interval 7-10 dní.	1.5 - 2.5
Ovocné stromy	1- 3 apl.: Od kvitnutia. Od prvého príznaku nedostatku.	1 - 2
Čitrusy	1-3 apl.: jarňá aplikácia, letná aplikácia	3 - 5
Hrozno	1-3 apl.: Po otváranie kvetných pukov	1 - 2

* Koncentrácia: 1-2 % w/v.

V prípade ošetrenia na list ako súčasť zmesi výrobkov, na ochranu plodín, treba vykonať test znášanlivosti pred prípravou postrekovej zmesi. Uvedené dávky, koncentrácia a fáza aplikácie závisia od miestnych podmienok, pôdnych podmienok, použitia iných hnojív a môžu byť dané až po presnej diagnóze.

Čistá hmotnosť 1.16kg | pH 5.5 +/- 0.5 | Teplota kryštalizácie: -4°C
 Dátum výroby/Číslo šarže: Uvedené na obale
 Doba použiteľnosti: 2 roky

Číslo vzájomného uznania: 1736

Distribútor pre SR: Bacaro s.r.o.
 Lichnerova 89/23, 903 01 Senec

Výrobca: Van Iperen International
 B.V. Smidsweg 24 3273 LK
 Westmaas | Holandsko Tel. +
 31(0)186 578 888
www.vaniperen.com



Scan this QR code

Pôvod: Holandsko
 Čistý objem:
 1, 5, 10, 200, 1 000 l

