FOLIT® Síra

800 SC

Čistý objem: **10 l**

Obsah živín v hm.%: 57 % elemetárna síra

koncentrát síry

OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKOV:

Spĺňa zákonom stanovené limity (mg/kg pomocné látky): Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 10,0; Cr ≤ 50,0.

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Folit Síra je určená k aplikácii na list k odstráneniu deficitu síry v pôde a k pokrytiu zvyšných nárokov na príjem síry niektorými plodinami, hlavne intenzívne pestovanými olejninami a obilninami

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

Folit Síra sa aplikuje postrekom ako doplnková výživa v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín. Nepoužívať v prípade silného slnka, vysokých teplôt a silného vetra. Pri stanovení konkrétnej aplikačnej dávky v rámci doporučeného rozmedzia je vhodné vychádzať z predchádzajúcich rozborov rastlín alebo pôd, dlhodobej znalosti výživových pomerov stanovišťa, predplodiny, kvality a úrovne základného hnojenia, rastovej fáze plodiny a klimatických podmienok. Nižšie dávky volíme pri slabšom deficite alebo pre delené aplikácie.

SKLADOVANIE

Hnojivo skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote +5 až +30 °C. Chráňte pred priamym slnečným svitom, mrazom a ohňom. Hnojivo je pri dodržovaní predpísaných podmienok skladovania a užívania stabilné, nepodlieha rozkladu, nepodlieha nebezpečným reakciám a neuvoľňuje do prostredia nebezpečné rozkladné produkty. Preto pri presnom dodržiavaní predpísaných aplikačných podmienok nehrozí pri použití hnojiva nebezpečie ohrozenia životného prostredia. Hnojivo je nehorľavé. Pri požiari je povolené použiť všetky hasiace médiá. V prípade použitia vody zaistite, aby kontaminovaná hasebná voda neprenikla do verejnej kanalizácie a nezasiahla zdroje spodných vôd a recipientov vôd povrchových.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Pred použitím bandasku pretrepte pre získanie homogénnej suspenzie. Za súčasného použitia všetkých prípustných komponentov v nádrži postrekovača (v 2/3 objemu naplneného vodou), pri zapnutom miešadle rozpustite v následnom poradí: síran horečnatý, močovina, rozriedený **Folit Síra** (1 liter hnojiva v 5 litroch vody), rozriedené ďalšie listové hnojivo aj pesticíd podľa návodu na jeho použitie. Nádrž doplňte vodou. Aplikačnú kvapalinu spotrebujte hneď po zmiešaní a postrek aplikujte pri stále zapnutom miešadle.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

H315 Dráždi kožu. **P280** Používajte ochranné rukavice PVC/ochranný odev/univerzálne ochranné okuliare alebo stredný tvárový štít. **P 302+P352** PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. **P332+P313** Pri podráždení pokožky: Vyhľadajte lekárske ošetrenie. **Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie.**

Používať iba v prípade skutočnej potreby! Neprekračovať doporučené dávkovanie!

Plodina	Dávkovanie (l/ha)	Termín aplikácie	Počet aplikací
Repka olejná	3,0–6,0	**jar:** po obnovení vegetácie, pred kvetom vo fáze zeleného pupeňa, po odkvete **jeseň:** vo fáze vytvárania listovej ružice (5–8 listov)	2–4
Obilniny	3,0–6,0	**jeseň:** fáza 3-4 listov **jar:** po obnovení vegetácie do konca odnožovania, vo fáze stĺpkovania až začiatku metania	1–3
Kukurica	4,0–6,0	fáza 4–6 listov, fáza 8–10 listov, 7–10 dní od posledného postreku	2–3
Cukrová repa	3,0–6,0	od 4–8 listov pred uzatvorením meziriadkov	1–2
Zelenina	3,0–6,0	**hlúbová a cibulová zelenina, hrach, fazula:** doporučujú sa preventívne postreky **ostatné druhy:** doporučuje sa preventívny postrek alebo v okamžiku zisteného nedostatku síry	1–2
Jabloň	3,0–6,0	vo fáze rastu zárodkov plodov, 10–14 dní po prvom postreku, vo fáze vývoja plodov	1–3

LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITEĽNÝCH ZVYŠKOV

Prázdne obaly od hnojiva, pracovné nástroje a pomôcky vypláchnite dostatočným množstvom vody tak, aby bolo dosiahnuté minimálneho doporučeného riedenia hnojiva pre aplikáciu. Získaný roztok aplikujte iba na ošetrenom pozemku. Takto vypláchnuté obaly možno uložiť do separovaného odpadu. Zbytky ďalej už nepoužitého hnojiva (akokoľvek znehodnoteného), ako aj obaly znečistené nepoužiteľným hnojivom patria do nebezpečného odpadu, sa nesmú dostať do kanalizácie a vodovodov a je nutné ich odovzdať na miestach k tomuto účelu určených orgánmi štátnej správy alebo do zariadení k odstraňovaniu nebezpečných odpadov.

VAROVANIE

8 594033 600600

Dátum výroby, číslo šarže:

Výrobca: Zaklady Chemiczne„Siarkopol“ TARNOBRZEG Sp. z o.o.

Doba použiteľnosti: 36 mesiacov odo dňa výroby.

CHEMAP AGRO

Dovozca: CHEMAP AGRO s.r.o.,
Dašice 475, 533 03, tel.: 466 670 941
www.chemapagro.cz