

CAMPOFORT® Fortestim-alfa

CZ



HNOJIVO ES

Kapalné dusíkaté hnojivo N (Mg, S), 15 (5-4) se zinkem, Zn

15,0 % (v/v) N amidický	vodorozpustný amidický dusík	194 g/l
5,0 % (v/v) MgO	vodorozpustný oxid hořečnatý	64 g/l
4,0 % (v/v) S	vodorozpustná síra	51 g/l
0,5 % (v/v) Zn	vodorozpustný zinek v chelátu s EDTA	7 g/l

Výrobce: AGRA GROUP a.s.,

Tovární 9, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic

Obsah balení: 27,3 kg • 819 kg • 1274 kg (tj. 21 litrů • 630 litrů • 980 litrů)

Podmínky skladování: Skladujte odděleně od potravin, mimo dosah dětí a v původních obalech. Doba použitelnosti: **36 měsíců** od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování. Hnojivo skladujte v původním balení, v zastřešené místnosti, při teplotě v hranici **-25 ÷ +30°C**. Maximální množství vrstev při skladování: kanystry 21 dm³ - 3 vrstvy • kontejner 1 m³ - 2 vrstvy.

Listové hnojivo **CAMPOFORT® Fortestim-alfa** se zvýšeným stimulačním účinkem je určeno pro časnou jarní aplikaci do ozimé pšenice, ozimého ječmene, žite a tritikale a pro první jarní aplikaci do pšenice jarní, ječmene jarního, kukuřice a prosa setého.

Používá se formou mimokořenové výživy postřikem na list rostlin.

Rozsah a způsob použití: Hektarová dávka: **9,1 kg / ha** (tj. 7 litrů / ha)

Při aplikaci dbáme těchto zásad:

1. Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku.
2. Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejítí rosy) nebo pozdně odpolední aplikace, postřik před deštěm nebo za deště není účinný.
3. Nestříkáme porosty fyziologicky či mechanicky poškozené nebo silně napadené chorobami a škůdci.
4. Nestříkáme porosty přehnojené dusíkem.
5. Na půdách s nízkou úrodností se účinek mimokořenové výživy rostlin nemůže dostatečně projevit.

Doporučené aplikace listového hnojiva CAMPOFORT® Fortestim-alfa

Plodina	Vývojová fáze BBCh (BBA)	kombinace s	hektarová dávka hnojiva / optim. množství vody
pšenice, tritikale, ječmen, žito	21 - 25	herbicydy, fungicidy, insekticidy	9,1 kg (7 litrů) CF / 120 litrů až 300 litrů
kukuřice	13 - 17	herbicydy, insekticidy	9,1 kg (7 litrů) CF / 150 litrů až 300 litrů
chmel	26 - 39	herbicydy, insekticidy	9,1 kg (7 litrů) CF / 1500 litrů až 2000 litrů

Obsah rizikových prvků v hnojivu

nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb.

(Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc: Při zasažení očí: okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv. Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.