

## HiCoat® Super Extender

HiCoat® Super Extender je aditívum k očkovacej látke HiCoat Super.

Dovozca: BASF Slovensko spol.s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Výrobca: BASF Agricultural Specialities Ltd, Harwood Industrial Estate, BN 17 7 AU West Sussex, Littlehampton, Harwood Road, Veľká Británie

Zloženie:

HiCoat Super Extender: Uhl'ovodíky, aditíva

Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v Maďarsku.

Prípravok sa uvádza na trh na základe rozhodnutia z Maďarska č. 04.2/1760-3/2016 NÉBIH

Balenie: HiCoat Super Extender: 6,4 l PE kanister

HiCoat® Super je očkovacia látka hľúzkovitých baktérií *Bradyrhizobium japonicum*. Zvyšuje úrodu plodiny a obsah bielkovín, oleja a ďalších nutričných látok a znižuje obsah antinutričných látok. Jeho použitie obmedzuje dávky dusíkatých hnojív, zvyšuje vyrovnanosť porastov a znižuje konkurenčný tlak burín.

Návod na použitie:

Prípravok HiCoat® Super s prípravkom HiCoat® Extender s je určený na inokuláciu sóje.

Prípravok obsahuje min.  $1 \times 10^{10}$  životaschopných buniek inokulantu *Bradyrhizobium japonicum* na ml. Pri aplikácii HiCoat Super zabezpečí  $10^5$  životaschopných rizóbií na osivo. Zmiešajte 6,4 l inokulantu HiCoat Super s prípravkom HiCoat Super Extender a aplikujte takto vzniknutú zmes v množstve 12,8 l na 4500 kg osiva.

Na ošetrenie osiva sóje aplikujte zo zmesi dvoch komponentov v pomere 1:1 (očkovacia látka HiCoat Super 1,42 l + HiCoat Super Extender 1,42 l), v množstve 2,84 l/t.

Pokiaľ je prípravok skladovaný pri teplote vyššej ako 20 °C, musí byť použitý najneskôr do 8 týždňov. Inokulované osivo skladujte na chladnom, tmavom mieste max.do 25 °C. Max. do 90 dní po inokulácii musí byť namorené osivo zasiate.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Pri práci s prípravkom dodržiavajte bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosť pri práci: pred pracovnou prestávkou alebo jedlom umyte si ruky vodou a mydlom. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.

Použite ochranný oblek, zásteru, ochranné čížmy a ochranné rukavice odolné voči chemikáliám. V prípade dlhodobého výkonu práce s inokulantom HiCoat Super v uzavretom priestore použite ochranu dýchania proti prachu s filtrom.

Prvá pomoc:

Po náhodnom požití: vypláchnite si ústa a potom vypite veľké množstvo vody.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte zasiahnuté oči s otvorenými viečkami pod tečúcou vodou aspoň 15 minút.

Po zasiahnutí pokožky: dôkladne umyte mydlom a vodou.

Po nadýchaní: postihnutému zabezpečte pokoj a pobyt na čistom vzduchu.

Skladovanie:

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplote 0°C do 10°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred teplom a mrazom. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 1 rok od dátumu výroby. Po otvorení balenia je doba skladovateľnosti 8 týždňov pri max. teplote 20 °C.

Zneškodnenie obalov:

Vyprázdnené a vypláchnuté nevratné PE obaly zneškodnite recykláciou na výrobky technického charakteru alebo spálte na vyhradenej skládke schválenej príslušným orgánom ochrany zdravia alebo iným kompetentným orgánom.