



Kukurica
Slad. jačmeň

Čistý
objem:
Číslo
typu:

10 l
5.4

Typ hnojiva: NPK hnojivo - roztokové

Obsah živín: N - 4,3 %, P₂O₅ - 14,4 %, K₂O - 3,8 %, Cu(EDTA) - 0,11 %, Zn(EDTA) - 1,2 %, B - 0,16 %, Mo - 0,0016 %, Ti v stopovom množstve



Používať iba v prípade skutočnej potreby. Neprekračovať doporučená dávkovanie.

Plodina	Dávkování	Termín aplikácie	Počet aplikácií
	(l/ha)		
Kukurica	2,0 – 6,0	Od fáze 6. listu do konca kvitnutia	1–3
Obilniny jarné	2,0 – 6,0	Od začiatku odnožovania do konca kvitnutia	1–2
Mak	2,0 – 6,0	Od fáze 6. listu do konca kvitnutia	1–2
Obilniny ozimné	2,0 – 6,0	V rámci jarnej regenerácie	1
Repka ozimná	2,0 – 6,0	Od 6. listu začiatku predĺžovacieho rastu	1–2
Strukoviny	2,0 – 6,0	V období intenzívneho rastu	1–2
Ostatné poľné plodiny	2,0 – 6,0	Vždy pri zhoršení príjmu živín z pôdy alebo v dobe intenzívneho rastu	1–3

LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITELNÝCH ZVÝŠKOV:

Prázdne obaly od hnojiva, pracovné nástroje a pomôcky vypláchnite dostatočným množstvom vody tak, aby bolo dosiahnuté minimálne doporučeného riedenia hnojiva pre aplikáciu. Získaný roztok aplikujte výhradne na ošetrovanom pozemku. Takto vypláchnuté obaly možno uložiť do separovaného odpadu. Zvyšky ďalej už nepoužitého hnojiva (akokoľvek znehodnoteného), tak aj obaly znečistené nepoužitelným hnojivom patria do nebezpečného odpadu, se nesmú dostať do kanalizácie a vodovodov a je nutné ich odovzdať na miestach k tomuto účelu určených orgánmi štátnej správy alebo do zariadenia k odstraňovaniu nebezpečných odpadov.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVÍ PRI PRÁCI:

P280 Používajte ochranné rukavice PVC/ochranný odev/univerzálne ochranné okuliare alebo stredný tvárový štít. **P305+P351+P338** PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. **P301+P330+P331** PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Dátum výroby/ Číslo šarže:



Výrobca: CHEMAP AGRO s.r.o., Dašice 475, 533 03

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov odo dňa výroby tel.: 466 670 941, www.chemapagro.cz

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA:

Kombinované listové hnojivo so zvýšeným obsahom fosforu a zinku pre základné použitie v kukurici, skorých vývojových fázach ozimov, maku i okopanín a v jačmeni jarnom. Hnojivo je ďalej doplnené o ďalšie makro a mikro prvky a obsahuje taktiež benefičné prvky Ni, Ti, pre zvýšenie enzymatickej aktivity v rastlinách. Hnojivo je využívané pre všeobecné doplnenie živín cez list pri zvýšenej intenzite výroby alebo zhoršených podmienkach príjmu živín z pôdy. Zvýšeného obsahu fosforu možno využiť pri všetkých ozimnách ako na jeseň, tak v rámci jarnej regenerácie, kedy je uvoľňovanie fosforu v pôde pomalšie.

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE:

Pri stanovení konkrétnej aplikačnej dávky v rámci doporučeného rozmedzia je vhodné vychádzať z predchádzajúcich rozborov rastlín alebo pôd, dlhodobej znalosti výživných pomerov stanovišťa, predplodiny, kvality a úrovne základného hnojenia, rastovej fázy plodiny a klimatických podmienok. Nižšie dávky volíme pri slabšom deficite alebo pre delené aplikácie.



SKLADOVANIE:

Hnojivo skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzavzatých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote +5 až +40°C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, mrazom a ohňom. Hnojivo je za dodržovaných predpísaných podmienok skladovania a užívania stabilné, nepodlieha rozkladu, nepodlieha nebezpečným reakciám a neuvolňuje do prostredia nebezpečné rozkladné produkty. Preto za presného dodržiavania predpísaných aplikačných podmienok nehrozí pri použití hnojiva nebezpečie ohrozenia životného prostredia. Hnojivo je nehorľavé. Pri požiari sú povolené použiť všetky hasiace médiá. V prípade použitia vody zaistíte, aby kontaminovaná hasebná voda neprenikla do verejnej kanalizácie a nezasiahla zdroje spodných vôd a recipientov vôd povrchových.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:

Pri príprave postrekovej kvapaliny dodržujte nasledujúci postup: nalejte odmerané množstvo hnojiva do menšieho množstva vody a rozmiešajte, nádrž postrekovača naplňte aspoň do polovice vodou, zapnite miešacie zariadenie, a za stáleho miešania nalejte pred miešaný roztok do nádrže, alebo použite primiešavacie zariadenie, ak je ním postrekovač vybavený. Pre aplikáciu hnojiva môže byť použité 100 - 400 l/ha postrekovej kvapaliny. Aj v prípade krátkej prestávky v práci, skôr než začnete znovu aplikovať kvapalinu, dôkladne rozmiešajte postrekovú kvapalinu v nádrži. Pripravenú postrekovú kvapalinu použite behom niekoľkých hodín.

ES hnojivo



8 594033 1 600686