

MACORESCO

HNOJIVO ES

TEKUTÉ HNOJIVO SO STOPOVÝMI ŽIVINAMI (ZINKOVÉ) PRE ÚPRAVU ZAKORENENIA RASTLÍN

NEBEZPEČIE



Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Toxický pro vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávať mimo dosah detí. Nevdychujte pary/aerosóly. Nevdychujte. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Okamžite zvlieknite znečistený odev. Opláchnite kožu vodou/osprchujte.

PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ je ich vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Odstráňte obsah/obal na schválené úložisko nebezpečných odpadov alebo vráťte predávajúcemu (distribútorovi alebo výrobcovi).

MACORESCO

Tekuté hnojivo so stopovými živinami (zinkové) pre stimuláciu zakorenenia rastlín zvýšením koreňovej hmoty. Pozitívne ovplyvňuje rast a výnosy. Hnojivo obsahuje amónny dusík s vysokou biologickou dostupnosťou pre rastliny. Listové hnojenie.

TYP HNOJIVA: E. 1. 7. e

Roztok zinkového hnojiva.

ŽIVINY

Obsah minerálnych živín	[% m/m]
Vodorozpustný zinok (Zn) (chloridový anion):	8,0 % (m/m)

DÁVKY A TERMÍN APLIKÁCIE

Plodina	Termín aplikácie	Dávka [l/ha]
REPKA JARNÁ A OZIMÁ	Používa sa vo fázy 2. až 6. pravého listu. Na repku ozimnú používať na jeseň, na jarnú na jar.	0,8 l/ha
OBILOVINY JARNÉ A OZIMNÉ	Používa sa na jar alebo na jeseň do konca odnožovania.	0,8 l/ha
KUKURICA	Používa sa vo fázy 2. až 6. pravého listu.	0,8–1,2 l/ha
ZEMIAKY	Používa sa vo fázy od 2. pravého listu až do fázy tvorby pukov.	0,8–1,2 l/ha
TRÁVA	Používa sa od fázy 2. listu do začiatku odnožovania.	0,8 l/ha

STRUKOVINY	Používa sa vo fázy dva až osem pravých listov.	0,8 l/ha
JAHODA	Plantáže jahôd založené z šľahúňov jahôd /rezov (počiatkom jesene), použitie po zakorenení sadeníc do počiatku vegetácie na jar, v fáze 1-3 listy. Plantáže frigo sadeníc: po zakorenení sadeníc, vo fázy 1-2 listy; v materských plantážach (jahodovniach) – pre podporu vývoja koreňov sadeníc, v dvoch dávkach každých 7-10 dní.	0,8–1,0 l/ha
MLADÉ SADY, ŠKÔLKY OVOCNÝCH STROMOV	Používajte dvakrát od začiatku vegetácie. Druhé ošetrovanie sa robí po 7-14 dňoch.	0,8–1,0 l/ha
CIBULOVÁ ZELENINA	Používajte vo fázy 3 pravých listov.	0,8–1,2 l/ha
KOREŇOVÁ ZELENINA	Používa sa postrekom na listy vo fázy 3 pravých listov.	0,8–1,2 l/ha
SADENICE ZELENINY	Používa sa postrekom na listy vo fázy 3-7 listov, 3-5 dní pred výsadbou.	kropením alebo striekaním - roztok 0,05–0,1% (0,05–0,1 l w 100 l vody)

Doporučené množstvo vody: 100-200 l/ha (poľnohospodárske plodiny), 500-1000 l/ha (ovocie) a 400-600 l/ha (plantáže).

Do porúčame postrek: štandardný a jemný

Upozornenie: Postup sa prevádza za kľudného počasia, v oblačných dňoch, skoro ráno alebo večer.

Zabráňte:

- postreku kvapaliny na susedné plodiny
- prekrytie kvapaliny na rozhraní ošetrovaných pásov a úvratí.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Výrobok možno použiť pre všetky typy postrekovačov. Pred prípravou postrekovej kvapaliny presne určite jej požadované množstvo. Niekoľkokrát pretrepte balenie. Odmerané množstvo nalejte do nádrže postrekovača čiastočne naplnený vodou (so zapnutým miešadlom) a doplňte vodou do požadovaného množstva. V postrekovači, ktorý nie je nevybavený hydraulickým miešadlom, je nutné kvapalinu rozmiešať ručne. Vyprázdnený obal je nutné 3 krát opláchnuť vodou a následne vodu z oplachovania preliať do nádrže postrekovača s postrekovou kvapalinou. Pripravený roztok použite okamžite po jeho príprave. Aplikujte so zapnutým miešadlom. Po dokončení práce prístroj dôkladne umyte. Vodu použitou k čisteniu zariadenia vystriekajte na už predtým ošetrovaný povrch.

Výrobok obsahuje vysokú koncentráciu živín, a preto počas skladovania môže dôjsť k miernej kryštalizácii, čo sa prejavuje vo forme kalu na dne balenia. V tomto prípade je nutné pevnou - vykryštalizovanou časť prípravku rozpustiť v teplej vode (50-60°C) a roztok naliať do nádrže postrekovača.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Nejedzte, nepite a nefajčite počas používania prostriedku.

Nevdychujte pary postreku.

Vyhýbajte sa kontaktu očí a pokožky.

Noste adekvátny ochranný odev, rukavice a okuliare alebo ochranu tváre.

ZACHÁDZANIE S ODPADMY

Prípravok a jeho obal odstraňujte ako nebezpečný odpad.

Úplne vyprázdnené obaly sa po dôkladnom vypláchnutí spália v schválenej spaľovni vybavenej dvojstupňovým spaľovaním s teplotou 1 200 – 1 400 °C v druhom stupni s čistením plynných splodín alebo sa znehodnotia a predajú sa prostredníctvom zberného miesta pro zvláštne a nebezpečné odpady do zberu k recyklácii alebo spálenie v schválenej spaľovni. Prípadne prázdne obaly vráťte predajcovi (distribútorovi alebo výrobcovi). Vlastné zneškodnenie obalov nie je povolené.

SKLADOVANIE

Skladujte v pôvodnom obale v chladnej, dobre vetranej miestnosti v pri teplote od 0 °C až +30 °C.

Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Uchovávajte mimo dosah detí.

LEKÁRSKA POMOC

Po požití: Dôkladne si vypláchnite ústa vodou (nepite mlieko, olej ani alkohol). Nevyvolávajte zvracanie.

Kontaktujte lekára a ukážte mu etiketu prípravku. Nebezpečie vdýchnutia: Preved'te alebo dopravte poškodeného mimo ošetrovanú oblasť, zaistite mu prístup k čerstvému vzduchu a odpočinok. V prípade výskytu znepokojujúcich príznakov privolajte lekára. Kontaminácia kože: Odložte kontaminovaný / nasiakli odev.

Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou s mydlom, pokožku následne dobre opláchnite. V prípade výskytu podráždenia kontaktuje lekára. Kontaminácia očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ je používate, a súčasne vyplachujte oči pri násilne široko roztvorených viečkach cca 10 minút čistou tečúcou vodou. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúce.

Kontaminované kontaktné šošovky nemožno znovu používať a je treba ich zlikvidovať. V prípade potreby kontaktujte oftalmológa. Príznaky otravy: bolesti hlavy či závrate, nevoľnosť, zvracanie, podráždenie, začervenanie kože, alergické reakcie, nádcha. Informácie týkajúce sa prvej pomoci pre lekára. Nedostatok špecifického proti lieku. Zahájiť symptomatickú podpornú starostlivosť. V prípade otravy orálnou cestou sa doporučuje vypláchnutie žalúdka a podanie aktívneho uhlia.

VÝROBCA

PUH Chemirol Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Polsko

Tel. +48(52) 318 88 00

www.chemirol.com.pl

VÝHRADNÝ DISTRIBUTOR

INNIVIGO Agrar CZ s.r.o.

Thamova 137/16

186 00 Praha 8

Tel. + 420 226 205 420

www.cz.innvigo.com

Balenie a objem: 1L 5 L 20 L

Dátum použiteľnosti: 5 rokov od dátumu výroby.

Č. šarže / dátum výroby: na obalu.

Čistá hmotnosť balenia.