

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MERLIN[®] 750 WG

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodorozpusťného mikrogranulátu určený na ničenie dvojkličnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Isoxaflutole 750 g/kg
(75% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

isoxaflutole CAS No.: 141112-29-0, natrium diisopropylnaphthalinsulphonat CAS No.: 1322-93-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:



GHS08



GHS09

Pozor

- H361d** **Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.**
- H411** **Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.**
- EUH401** **Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.**
- P280** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P308+P313** Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhl'adajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- P501** Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
-
- Z4** **Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.**
- Vt5** **Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.**
- Vo2** **Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.**
- V3** **Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.**
- Vč3** **Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.**

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržte ochrannú zónu!

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami!

Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Zákaz skrmovania ošetrovaných rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami - dodržte ochrannú dobu!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie: BAYER spol. s r.o., Karadžičova 2, 811 09, Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **97-11-0331**

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

Balenie: 500 g HDPE fľaša

MERLIN[®] je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer AG.

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

Isoxaflutole, účinná látka prípravku MERLIN 750 WG, je absorbovaná najmä koreňmi a vzchádzajúcimi rastlinami, na citlivé rastliny pôsobí počas vzchádzania, vzídené rastliny po ošetroaní majú nedostatok chlorofylu. Buriny pri priaznivých vlhkových podmienkach väčšinou nevzídu vôbec, alebo vzídu vybielené a následne odumierajú. Buriny, v suchých podmienkach, môžu vzchádzať z hĺbky, ale vzhľadom na dobrý reziduálny účinok v pôde je prípravok pri prvých dažďových zrážkach aktivovaný a až potom dochádza k pôsobeniu na buriny. Isoxaflutole je taktiež absorbovaný listami vzídených mladých burín. Pôsobí aj na buriny rezistentné voči triazínovým herbicídum. Isoxaflutol sa vyznačuje malým pohybom v pôde. Prípravok má v pôde reziduálny účinok po dobu niekoľko týždňov a preto v priaznivých poveternostných podmienkach zabraňuje rastu burín až do doby, kedy kukurica zakryje pôdu. Isoxaflutole je pre kukuricu dostatočne selektívny.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny (dávka 100-130 g.ha⁻¹): podslnečník Theofrastov, láskavec ohnutý, kapsička pastierska, durman obyčajný, prstovka krvavá, ježatka kuria, zemedym, mrlík biely, hluchavka purpurová, rumanček, proso siate, stavikrv vtáčí, portulaka zeleninová, mohár zelený, horčica roľná, ľuľok čierny, hviezdica prostredná.

Stredne citlivé buriny: slnečnica ročná, kochia metlovitá, cirok dvojfarebný, voškovník obyčajný.

Odolné buriny: pohánkovec ovíjavý.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
kukurica	dvojkľúčolistové buriny a jednoročné tráv	0,1-0,13 kg	AT	-

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody 200-400 l/ha.

Počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1×

MERLIN 750 WG v kukurici aplikujte preemergentne do 4 dní po výseve. Dávku voľte s ohľadom na miestne pôdne podmienky. Základnú dávku je potrebné pri aplikácii na neutrálnych a zásaditých pôdach upraviť nasledovne:

- na pôdach s pH<6,5 možno použiť plnú dávku 130 g.ha⁻¹ prípravku MERLIN 750 WG
- na pôdach s pH 6,5-7 použite najviac 120 g.ha⁻¹ prípravku MERLIN 750 WG
- na piesčitých pôdach odporúčame použiť najviac 100 g.ha⁻¹ prípravku MERLIN 750 WG
- na pôdach s pH>7 a na extrémne ľahkých pôdach a štrkových pôdach neodporúčame použiť MERLIN 750 WG z dôvodu možného rizika fytotoxicity.

UPOZORNENIE

Prípravok je účinný už v nízkych hektárových dávkach. Vyvarujte sa preto jeho predávkovaniu a prekrytiu postrekových pásov, inak hrozí nebezpečenstvo zníženia selektivity postreku. Dodržujte hĺbku výsevu a zabezpečte zahrnutie riadkov vysiatej kukurice. Aby sa neznížila účinnosť prípravku, kultivujte najskôr od 15 cm výšky kukurice.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia (Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú plodinu alebo rastlinné produkty.

Tolerancia kukurice je však ovplyvňovaná niekoľkými faktormi, najmä: pH a druhom pôdy, dávkou prípravku a priebehom poveternostných podmienok. Niektoré hybridy môžu mať na zásaditých a v niektorých prípadoch aj neutrálnych pôdach a na piesčitých pôdach s nízkym obsahom organického podielu krátkodobu mierne vybielené listy. Tejto skutočnosti je vhodné prispôsobiť dávkovanie prípravku. Taktiež silné zrážky v období klíčenia a vzhádzania môžu zvýšiť citlivosť kukurice voči prípravku. Vybielenie listov býva krátkodobé a nemá vplyv na vývoj rastlín, ani na úrodu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Isoxaflutole patrí do skupiny F2 podľa klasifikácie HRAC (komisia pre rezistenciu herbicídov). Zatiaľ nebola zistená rezistencia burín k žiadnej z účinných látok patriacich do tejto skupiny. V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

1. dodržiavať zásady striedania plodín
2. dodržiavať zásady správnej agrotechniky, pred výsevom ničiť vzídené buriny plytkou kultiváciou alebo chemicky neselektívnymi herbicídmi
3. pri opakovanom pestovaní kukurice na tých istých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnych chemických skupín
4. používať čistené certifikované osivo na zabránenie prenosu semien burín medzi pozemkami a regiónmi.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok MERLIN 750 WG nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Isoxaflutole neovplyvňuje následné plodiny.

Ako náhradnú plodinu je možné po orbe pestovať kukuricu, zemiaky, raž, trávy, mrkvu a hrach. Neodporúčame pestovať sóju, slnečnicu, horčicu a špenát.

Pri ošetrovaní zabráňte zasiahnutiu susediacich plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri správnom použití prípravku MERLIN 750 WG nehrozí nebezpečenstvo pre užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Aby bolo zabezpečené dokonalé rozpustenie, odporúčame zmes pred postrekom intenzívne premiešavať po dobu niekoľkých minút. Počas transportu aplikačného roztoku, postreku aj počas pracovných prestávok odporúčame udržiavať miešacie zariadenie neustále v činnosti. Prípravený aplikačný roztok spotrebujte do 2 hodín.

Prípravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekovač vyčistite nasledujúcim postupom ihneď po aplikácii, inak hrozí riziko, že zvyšky postrekovej tekutiny v postrekovači alebo jeho častiach zaschnú a budú sa ťažko odstraňovať.

1. Vystriekajte všetky zvyšky postrekovej tekutiny na ošetrovanom pozemku.
2. Demontujte sacie, výtlačné a tryskové filtre a dôkladne ich vyčistite vo vode.
3. Naplňte postrekovač vodou v množstve zodpovedajúcom 10 % objemu nádrže a postrekovač dôkladne prepláchnite (použite rotačnú čistiacu trysku, pokiaľ je nainštalovaná).
4. Vystriekajte výplachovú tekutinu na práve ošetrovanom pozemku.
5. Vypláchnite postrekovač ešte raz opakovaním kroku 3 a 4.
6. Znovu skontrolujte filtre a odstráňte z nich všetky prípadné zvyšky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití: vypláchnuť ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadať lekárske ošetrovanie.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrovanie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužitý zvyšok prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriadení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužitý zvyšok postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.