

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

MILDICUT

Fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Cyazofamid	25 g/l (2,03% hm)
Disodium phosphonate	250 g/l (20,32% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: žiadne

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

nepožaduje sa

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním výrobcovi alebo oprávnenej osobe.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke minimálne 5m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B – bus 9, B-1831 Diegem, Belgicko

Výrobca:

ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B – bus 9, B-1831 Diegem, Belgicko

Číslo autorizácie: **12-02-1239**

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

Balenie a objem: 1 l a 1,5 l HDPE fľaša

Doba použiteľnosti prípravku: 2 roky od dátum výroby pri skladovaní v neporušených originálnych obaloch a dodržaní stanovených podmienok skladovania

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

Fungicíd MILDICUT je kontaktný prípravok. Pôsobí proti peronospóre viniča (*Plasmopara viticola*). Po absorpcii rastlinou pôsobí ako inhibítor respirácie v mitochondriách buniek patogéna. Má preventívny účinok a preto musí byť použitý pred vznikom infekcie na poraste. V závislosti od intenzity napadnutia je možné aplikovať prípravok proti peronospóre viniča v intervaloch 7 – 14 dní.

Chemická skupina: cyanoimidazol

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
vinič	peronospóra viniča	4,5 l	21	

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Aplikačná dávka: Aplikačná dávka prípravku MILDICUT je 4,5 l/ha.

Dávka vody: Zaistite dobré pokrytie porastu postrekovou kvapalinou najmä v priebehu rýchleho rastu rastlín. Odporúča sa použiť 500 – 1500 litrov aplikačnej kvapaliny/ha. Množstvo aplikačnej kvapaliny je závislé od stavu porastu, infekčného tlaku a spôsobu aplikácie.

Termín ošetrovania: Prvú aplikáciu proti peronospóre viniča vykonajte podľa signalizácie alebo pri vzniku infekcie.

Aplikačný program: Pri miernom infekčnom tlaku alebo pred výskytom choroby ošetrujte v intervale 7 – 14 dní. V prípade silnejšieho infekčného tlaku alebo pri intenzívnom raste viniča musí byť prípravok MILDICUT aplikovaný v skrátenom intervale minimálne 7 dní.

Maximálny počet aplikácií: 6x za vegetačné obdobie.

Prípravok MILDICUT sa neodporúča aplikovať na rastliny, ktoré majú byť použité na množenie.
Ochranná doba: Posledný postrek aplikujte najneskôr 21 dní pred zberom.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

MILDICUT nie je pre vinič fytotoxický. Nemá žiadne negatívne pôsobenie pri použití podľa návodu. Nebol zistený žiadny negatívny vplyv na susedné plodiny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

MILDICUT obsahuje dve účinné látky: cyazofamid (skupina cyanoimidazole, C4 podľa FRAC) a disodium phosphonate (skupina phosphonates, 33 podľa FRAC). Obidve látky sú účinné proti peronospóre viniča, pričom disodium phosphonate zároveň významne indukuje vlastný obranný systém rastliny a má synergický účinok na cyazofamid. Vývoj menej citlivých alebo rezistentných kmeňov patogénov proti 2 účinným látkam s rozdielnymi mechanizmami účinku je nepravdepodobný, hoci sa nedá úplne vylúčiť. Z toho dôvodu odporúčame použiť prípravok MILDICUT vo fungicídnom programe maximálne 6 krát za sezónu, pričom je potrebné ho pravidelne striedať s prípravkom s rozdielnym spôsobom účinku. Je možné aj ošetrovanie v blokoch - t.j. prípravok aplikovať v dvoch blokoch s tromi ošetrovaniami (alebo v troch blokoch s dvomi ošetrovaniami), pri striedaní s blokom prípravkov s iným spôsobom účinku. Pri aplikácii je vždy nutné dodržiavať uvedené dávkovania a intervaly medzi ošetrovaniami.

V prípade, že bude po opakovanom použití prípravku zistená znížená účinnosť prípravku, neodporúčame už v danom vegetačnom období prípravok použiť. V takomto prípade je potrebné zvoliť prípravky s rozdielnym spôsobom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku MILDICUT nemá negatívny vplyv na úrodu, neovplyvňuje proces fermentácie a organoleptické vlastnosti vína.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní návodu na použitie nehrozí poškodenie plodín, ktoré budú na ošetrovanom pozemku pestované v rámci normálneho osevného postupu ani v prípade potreby zaorania plodiny.
Aplikáciou nesmú byť zasiahnuté cieľové porasty a susediace rastliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Použitie prípravku MILDICUT nemá vplyv na populácie užitočných dravých roztočov.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu,

ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

- 1) Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).
- 2) Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom Agropuru.
- 3) Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.
- 4) Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

Použitie aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom Agropuru a umyte 3× vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Vystríhajte sa akémukoľvek styku s prípravkom, ak nie je nutný. Nesprávne použitie môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie.

Pri práci s prípravkom použite iba schválené ochranné pomôcky: ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny použite zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu. Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite.

Po skončení práce dôkladne umyte ochranný odev.

Pred jedlom, pitím a fajčením si vždy umyte ruky. Po skončení práce si umyte celé telo teplou vodou a mydlom.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

PRVÁ POMOC

Pri požití: podajte postihnutému vypiť cca 0,5 l pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletkami medicínalného uhlia. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, zvracanie nevyvolávajte a nič nepodávajte ústami. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: odstráňte postriekaný odev, pokožku umyte teplou vodou a mydlom +

Pri nadýchaní: prerušte prácu, zabezpečte postihnutému pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri zasiahnutí očí: premývajte prúdom pitnej vody po dobu 10 – 15 minút. Ak príznaky podráždenia pretrvávajú, zabezpečte očné vyšetrenie.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel.: 02/ 54 774 166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom

skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy

Pred použitím prípravku si prečítajte pozorne návod na použitie.

Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.