

MV – BÓR 150

Výrobca: Lovochemie a.s., Terežinská 57, Lovosice, Česká republika

Dovozca pre Slovensko: LUCAGRA s.r.o., Lichnerova 23, 903 01 Senec

Hnojivo je kvapalný koncentrát stopového prvku bóru viazaného ako bóretanolamín

Chemické a fyzikálne vlastnosti:

Znak akosti	Hodnota
Bór ako B v %hm.	11,0
pH zriedeného roztoku (1:5)	7,0 až 9,0
Hustota v kg/l pri 20 °C	cca 1,38

Obsah rizikových látok:

Splňuje zákonom stanovené limity: (mg/kg hnojiva) kadmium max. 1,0; olovo max. 10; ortuť max.1,0; arzén max. 10; chróm max. 50

Rozsah a spôsob použitia:

Používa sa k preventívnemu alebo kuratívne odstráneniu nedostatku využiteľného bóru v rastlinách. Pri kuratívnej aplikácii formou postreku na list odstraňuje fyziologické anomálie spôsobené nedostatkom tohto prvku v rastline. Preventívne sa aplikuje do porastov na stanovištiach s vysokým deficitom bóru. Preventívnu aplikáciu je možné tiež odporučiť u kultúr náročných na dostatočnú zásobu bóru. K takto náročným plodinám patrí: repka olejná, mak, slnečnica, cukrová repa, kýmna repa, ovocie, okrasné rastliny.

Aplikácia:

Pre foliárnu aplikáciu: Najvhodnejšie použitie je začiatkom vegetácie po vytvorení listovej plochy. Od tejto doby je možné hnojivo aplikovať v 14 denných intervaloch minimálne 3x za sebou. Hnojivo je možné aplikovať po celú dobu vegetácie. Jedna dávka je 2-3 l koncentráta na hektár. V dobe kvitnutia hnojivo priaznivo pôsobí na prerastanie peľových váčkov a tým aj na tvorbu semien a plodov. Vhodná doba pre aplikáciu je za vyššej relatívnej vlhkosti a nižších teplotách. Optimálne je skoro ráno, večer alebo pri zamračenej oblohe.

Plodina	Doba aplikácie	Počet aplikácií	koncentrácia v l/ha
Repka olejná	1. aplikácia: na jeseň, BBCH 13-14 2. aplikácia: na jar, BBCH 30 do butonizácie	1 1	3 3
Cukrová repa	1. aplikácia: po dokončení tvorby listovej ružice, 2. aplikácia: v 14 dennom intervale	2	3
Jadroviny Kôstkoviny	1. aplikácia: pri otváraní púčikov, 2. a 3. aplikácia: v intervale 14 dní	2 až 3	2
Zelenina	1. aplikácia: 3 týždne po výsadbe, 2. aplikácia: po 4 týždňoch	2	1
Vinič	1. aplikácia: pri otváraní púčikov, 2. aplikácia: pri kvitnutí, 3. aplikácia: pri raste plodov	3	3
Ozimné obilniny	1. aplikácia: po skončení zimy	1	2

Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Výstražné symboly nebezpečnosti: nie sú

Signálne slovo: nie je

Štandardné vety o nebezpečnosti: žiadne

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

P405+P102 – Skladujte uzamknuté. Uchovávať mimo dosah detí.

P403 – Skladujte na dobre vetranom mieste.

P220 – Uchovávať oddelene od potravín

P262 – Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom.

P305+351+338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

P302+P352 – PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P280 – Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranný štít.

P314 – Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrovanie

Hnojivo ani jeho zvyšky nesmú znečistiť vodné zdroje vrátane povrchových vôd.

Skladovanie:

Skladujte v pôvodných obaloch. Teplota výrobku pri skladovaní nesmie klesnúť po +5°C.

Objem balenia: 20 l

Hmotnosť balenia: 27,6 kg (1 l = 1,38 kg)

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov pri skladovaní v pôvodných obaloch

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale