

MV – štartovacie

Výrobca: Lovochemie a.s., Terežinská 57, Lovosice, Česká republika
Dovozca pre Slovensko: LUCAGRA s.r.o., Lichnerova 23, 903 01 Senec

číslo typu:

číslo certifikátu UKSUP:

NPK 12 – 4 – 6 so stopovými živinami je kvapalné viaczložkové hnojivo, obsahujúce dusík (N), fosfor (P), draslík (K), ktorý je v bezchloridovej forme a stopové živiny. Surovinou pre výrobu hnojiva sú PK soľ, NP soľ, močovina, koncentrát stopových prvkov a voda.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:

Znak akosti	Hodnota
Celkový dusík ako N v %	12,0
Močovinový dusík ako N v %	12,0
Fosfor ako P ₂ O ₅ v %	4,0
Draslík ako K ₂ O v %	6,0
Zinok ako Zn v %	0,002
Meď ako Cu v %	0,0015
Molybdén ako Mo v %	0,002
Železo ako Fe v %	0,0016
Mangán ako Mn v %	0,007
Bór ako B v %	0,0025

Obsah rizikových látok:

Splňuje zákonom stanovené limity: (mg/kg hnojiva, u Cd v mg Cd/ kg P₂O₅): kadmium 50; olovo 15; ortuť 1; arzén 10; chróm 150

Rozsah a spôsob použitia:

Hnojivo zriedené s vodou je univerzálnym hnojivom, aplikuje sa zálievkou alebo postrekom. Po zriedení sa používa k základnému hnojeniu pri pestovaní väčšiny plodín a kultúr. Je vhodný pre koreňovú i mimokoreňovú aplikáciu. Pri použití podľa požiadaviek na hnojenie rastlín je hnojivo bezo zvyšku spotrebované a nedochádza k zasoľovaniu pôdy. U vytrvalých kultúr je možné urobiť hnojenie i po zbere. Používa sa i k dodatočnému mimokoreňovému hnojeniu rastlín, najmä v prípadoch kedy je príjem živín koreňmi sťažený. To môže byť napr. za nepriaznivého počasia. Hnojivo sa aplikuje v ranných alebo večerných hodinách. Za intenzívneho slnečného žiarenia je u citlivých kultúr riziko popálenia. Mimokoreňová výživa sa vykonáva v priebehu hlavnej vegetačnej doby v čiastočných dávkach v najmenej 14 dňových odstupoch. Používa sa ako plné hnojivo. Svoju nezastupiteľnú úlohu má hnojivo v ovocinárstve (u viniča, jabloní apod.), v zeleninárstve u plodín ako sú cibuľa, cesnak, pór a celkovo u všetkej koreňovej zeleniny.

Hnojivo je vďaka vysokému obsahu fosforu a kombinácii ostatných živín veľmi vhodné k aplikácii na všetky kvitnúce rastliny. Môžeme odporučiť pre použitie na balkónové i záhradné kvetiny.

Hnojivo je vhodné pre oblasti ochranných pásiem pitnej vody.

Aplikácia:

Pre použitie k zálievke nalejeme odmerané množstvo 20 ml (1 viečko od 5 a 20 l balenia) hnojiva do 4 l vody. Roztok dôkladne premiešame a je pripravený k použitiu. Aplikujeme minimálne v 14-dňových intervaloch.

Pre foliárnu aplikáciu sú max. doporučené dávky v rozmedzí 4 - 6 l koncentráta na hektár. Koncentrácia aplikovanej kvapaliny by sa mala pohybovať v rozmedzí 0,5 – 1 % roztoku.

Plodina	Doba aplikácie	Počet aplikácií	koncentrácia v l/ha
Obilniny, olejnin	Od fázy 21 do 59	3 až 5	4 – 6
Strukoviny	pred kvetom, ďalší po troch týždňoch	4 až 5	5
Repka olejná	Od fázy 20 do fázy 60	3 x	5 – 6
Zemiaky	Od fázy 31 do 60	4 x	4 – 5
Repa	Od fázy 14 do 39	2 x	3 – 5
Plodová zelenina	2 x pred kvetom, 3 až 4 x po násade plodov	5 až 6	4 – 5
Listová zelenina	počas vegetácie spolu s pesticídmi ako 0,5 – 1,0 % roztok	4 až 6	
Vinič	po odkvete pri použití pesticídov ako 0,5% roztok	6 - 8	4 – 5
Jadroviny, kôstkoviny	po odkvete pri použití pesticídov ako 0,5 – 1,0 % roztok	5 - 10	
Chmeľ	počas celého vegetačného obdobia spolu s pesticídmi	4 - 6	4 – 5
Jahody	v intervale 14 dní až do zberu ako 0,5 – 1,0 % roztok	2 - 4	

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

S 2	Uschovávajúte mimo dosahu detí
S 24/25	Zamedzte styku s kožou a očami
S 26	Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc
S 46	Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
S 36/37/39	Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít

Hnojivo ani jeho zvyšky nesmú znečistiť vodné zdroje vrátane povrchových vôd.

Objem balení: 20, 1000 litrov, cisterny

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov pri skladovaní v pôvodných obaloch

Dátum výroby:

Číslo výrobnnej šarže: