

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

PLEDGE® 50 WP

PLEDGE® 50 WP herbicídny prípravok do slnečnice, kukurice a ozimných obilnín vo forme vodorozpustného prášku.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Flumioxazin **500 g/kg**
(50 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: flumioxazin, CAS No.: 103361-09-7

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:



GHS08



GHS09

Nebezpečenstvo

- H360D** Môže poškodiť nenarodené dieťa.
- H410** Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- EUH401** Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
- P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
- P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi nariadeniami.
-
- SP1** Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd./ Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
- SPe3** Z dôvodu ochrany vodných organizmov (vyšších vodných rastlín a rias) udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 metrov.
- SPo2** Ochranný odev po aplikácii očistite.
-
- Z4** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky, alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.
- Vt5** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
- Vo1** Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca: SUMITOMO Chemical Agro Europe S.A.S., Parc d’Affaires de Crécy, 10A rue de al Voie Lactée, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Francúzska republika

Držiteľ autorizácie: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Parc d’Affaires de Crécy, 10A rue de al Voie Lactée, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Francúzska republika

Distribútor: MV-servis, s.r.o., Lichnerova 23, 903 11 Senec, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **07-11-0874**

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

Balenie: vodorozpustné vrecká, (PVAL), 5 x 60 g v PE fólii a papierová krabica
 vodorozpustné vrecká (PVAL), 5 x 80 g v PE fólii a papierová krabica,
 vodorozpustné vrecká (PVAL), 2 x 200 g v PE fólii a papierová krabica,
 vodorozpustné vrecká (PVAL), 2 x 320 g v PE fólii a papierová krabica,
 vodorozpustné vrecká (PVAL), 2 x 400 g v PE fólii a papierová krabica

PLEDGE® je obchodná známka, ktorú vlastní spoločnosť Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok PLEDGE® 50 WP je herbicíd s účinnou látkou flumioxazin zo skupiny inhibítorov enzýmu protoxu (PPO). Na povrchu a tesne pod povrchom pôdy tvorí herbicídny film. Ničí citlivé buriny **pri preemergentnom aj postemergentnom použití** (na buriny účinkuje pôdne aj cez list). Prípravok PLEDGE® 50 WP pri preemergentnom použití zasahuje najmä hypokotyl a kľúčne listy vzchádzajúcich burín. Prípravok PLEDGE® 50 WP pri postemergentnom použití zasahuje listy a ostatné časti burín nad povrchom pôdy - dochádza tu najskôr k silným fyto toxickým prejavom („spálenie“ povrchu burín, škvrny na povrchu); neskôr postupnému vädnutiu, žltnutiu až zhnednutiu a následnému zasychaniu zasiahnutých rastlín. Prípravok si zachováva účinnosť cez pôdu na nové

vzchádzajúce buriny aj pri postemergentnom použití. Zrážky podporujú účinnosť prípravku. Účinok sa prejaví o 1-5 dní.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

PLEDGE® 50 WP - účinnosť na buriny vyskytujúce sa v snečnici a v kukurici

Účinnosť	pri PRE - aplikácii	pri POST - aplikácii	pri POST aplikácii + zmáčadlo
citlivé buriny - účinnosť nad 85%	drchnička roľná; durman obyčajný; hviezdica prostredná; ibištek trojdielny; láskavce (ohnutý, zelenoklasý); kapsička pastierska; peniažtek roľný, veroniky, rumančekovité buriny	durman obyčajný; hviezdica prostredná; lipkavec obyčajný; loboda konáristá; kapsička pastierska; láskavce (ohnutý, zelenoklasý); ľuľok čierny; podsľnečník Theofrastov	durman obyčajný; fialka roľná; hviezdica prostredná; ibištek trojdielny; iva voškovníkovitá; láskavce (ohnutý, zelenoklasý); lipkavec obyčajný; loboda konáristá; ľuľok čierny; mrlíky (biely, hybridný); kapsička pastierska; podsľnečník Theofrastov; pohánkovec ovíjavý; voškovník obyčajný
stredne citlivé buriny - účinnosť 70% - 85%	fialka roľná; horčiaky (obyčajný, štiavolistý); lipkavec obyčajný; mrlíky (biely, hybridný); pohánkovec ovíjavý	ambrózia palinolistá; fialka roľná; horčiaky (obyčajný, štiavolistý); ibištek trojdielny; iva voškovníkovitá; mrlíky (biely, hybridný); pohánkovec ovíjavý; pupenec roľný; veroniky; voškovník obyčajný	ambrózia palinolistá; drchnička roľná; horčiaky (obyčajný, štiavolistý); parumanček nevoňavý; pupenec roľný; rumančeky, rumany; veroniky
odolné buriny - účinnosť pod 70%	bažanka ročná, ambrózia palinolistá; iva voškovníkovitá; pichliač roľný; pupenec roľný; stavikrv vtáčí; voškovník obyčajný	bažanka ročná; drchnička roľná; parumanček nevoňavý; pichliač roľný; rumančeky; rumany; stavikrv vtáčí	pichliač roľný; stavikrv vtáčí

PLEDGE® 50 WP - účinnosť na buriny vyskytujúce sa v ozimných obilninách (pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale)

PLEDGE® 50 WP 60 g/ha POST

Citlivé buriny:

- fialky, veroniky, hluchavky, rumančeky, mak vlčí, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, pakosty, peniažtek roľný

Stredne citlivé buriny:

- metlička obyčajná, lipkavec obyčajný, výmrav repky

Odolné buriny:

- pýr plazivý, pichliač roľný

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	Ochranná doba	Poznámka
slničnica	dvojkličnolistové buriny	80 g	AT	PRE
		80 g	AT	POST
		80 g + (100-200 ml)	AT	(TM) Trend 90 - POST
		80 g + (50 ml)	AT	(TM) Silwet L-77 - POST
kukurica	dvojkličnolistové buriny	80 g	AT	PRE
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale	dvojkličnolistové buriny a metlička	60 g	AT	POST

Dávka vody: 300-400 l.ha⁻¹

Maximálny počet ošetrení: 1× za rok (slničnica, kukurica), 1× za vegetačné obdobie (pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale)

POKYNY PRE APLIKÁCIU**SLNEČNICA**

Prípravok PLEDGE® 50 WP aplikujte do 3 dní po sejbe, pred vzchádzaním slnečnice (**preemergentne**), alebo v štádiu 2-4 pravých listov slnečnice (**postemergentne**).

Predpokladom dobrého účinku preemergentného ošetrenia je dobre spracovaný pôdny povrch, drobnohrudkovitá pôdna štruktúra, bez rastlinných zvyškov a primerané zrážky do 14 dní od aplikácie.

Prípravok v prípade **postemergentnej** aplikácie nesmie byť aplikovaný v štádiu klíčnych listov slnečnice až do 1. páru pravých listov. Odporúčame aplikáciu v rastovej fáze 2-4 pravých listov slnečnice t.j. BBCH 12-14. Nikdy nie pred fázou 2 pravých listov slnečnice.

Nikdy neaplikujte vo fáze klíčnych listov slnečnice!

Dôležité je, že aj v prípade postemergentnej aplikácie si prípravok zachováva pôdnu účinnosť (na povrchu a tesne pod povrchom tvorí herbicídny film). Primerané zrážky sú dôležité pre optimálnu účinnosť prípravku aj pri postemergentnej aplikácii. Ak dlhodobo pretrváva počasie bez zrážok (sucho) a ani predpovede počasia po predpokladanej postemergentnej aplikácii neindikujú zrážky, je možné použiť zmáčadlo.

Optimálna rastová fáza burín pri postemergentnej aplikácii je štádium klíčnych listov, max. do štádia 2-4 pravých listov burín, kedy sú buriny najcitlivejšie na prípravok PLEDGE® 50 WP. Účinok na prerastenejšie buriny môže byť slabší.

KUKURICA

Prípravok PLEDGE® 50 WP aplikujte do 3 dní po sejbe, pred vzchádzaním kukurice (**preemergentne**). Predpokladom dobrého účinku preemergentného ošetrenia je dobre spracovaný pôdny povrch drobnohrudkovitá pôdna štruktúra, bez rastlinných zvyškov a primerané zrážky do 14 dní od aplikácie.

PŠENICA OZIMNÁ, JAČMEŇ OZIMNÝ, TRITIKALE

Prípravok PLEDGE® 50 WP odporúčame v ozimných obilninách aplikovať na jeseň buď do 3 dní po sejbe, pred vzchádzaním obilnín (**preemergentne**), alebo v štádiu BBCH 11-14, t.j. od vzchádzania obilniny do 4 listov obilniny (**skoro postemergentne**). Buriny by nemali presiahnuť štádium klíčnych listov.

Predpokladom dobrého účinku prípravku PLEDGE® 50 WP je dobre spracovaný pôdny povrch, drobnohrudkovitá pôdna štruktúra, bez rastlinných zvyškov a primerané zrážky do 14 dní od aplikácie.

Aj v prípade postemergentnej aplikácie si prípravok PLEDGE® 50 WP zachováva pôdnu účinnosť.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Slnečnica alebo kukurica - pri preemergentnej aplikácii môže dôjsť vplyvom vzájomného pôsobenia viacerých kritických faktorov k prejavom fytotoxicity, alebo aj k čiastočnému, prípadne až k úplnému zničeniu porastu!

Medzi kritické faktory, kedy neodporúčame preemergentnú aplikáciu prípravku PLEDGE® 50 WP patria:

- ľahké piesočnaté pôdy s nízkym obsahom humusu, svetlé pôdy s nízkym pH, nepriepustné pôdy s rizikom státia vody po privalových zrážkach
- privalové zrážky. Ak sa prípravok dostáva z pôdy na listy (napr. odrazom častíc pôdy na listy pri búrkach), môžu vzniknúť škvrnitosti a listové deformácie, ktoré nemajú negatívny vplyv na úrodu a listy sú rýchlo nahradené novými. Avšak ak klíčiaca rastlina stojí vo vode na pozemku kde sa urobila preemergentná aplikácia, alebo keď je účinná látka flumioxazin na piesčitých pôdach splavená ku vzchádzajúcej rastline môže dôjsť k nenávratným poškodeniam porastu.

Odporúčame, v prípade prítomnosti alebo možnosti týchto kritických faktorov, použiť postemergentnú aplikáciu (iba v slnečnici, v kukurici nie je možná).

Slnečnica - pri postemergentnej aplikácii môže dochádzať k prejavom fytotoxicity (škvrnitosť listov a listové deformácie) vplyvom vzájomného pôsobenia viacerých kritických faktorov ako sú výdatné privalové zrážky a chlad. Takáto fytotoxicita je len kontaktná a dočasná a nemá vplyv na úrodu. Slnečnica rýchlo zregeneruje a na ďalších nových listoch už prejavy fytotoxicity nie sú.

Zmäčadlo zvyšuje razanciu účinku a preto môže zvýšiť prejavy fytotoxicity (škvrnitosť listov a listové deformácie) a to najmä v prípadoch, keď v čase dlhodobiejšieho suchého počasia aplikujete prípravok PLEDGE® 50 WP so zmäčadlom a následne sa vyskytnú zrážky. Takáto fytotoxicita je len kontaktná a dočasná a nemá vplyv na úrodu. Slnečnica rýchlo zregeneruje a na ďalších nových listoch už prejavy fytotoxicity nie sú.

PLEDGE® 50 WP pri postemergentnej aplikácii nie je možné kombinovať so žiadnym iným pesticídom ani hnojivom, ináč dôjde k fytotoxickým prejavom. Pri potrebe aplikácie iného postemergentného herbicídu alebo hnojiva je preto potrebné dodržať odstup aspoň 7 dní.

Obilniny - pri postemergentnej aplikácii môže dôjsť k prejavom fytotoxicity (ľahké zožltnutie porastu, prípadne jemne pripálené listy).

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Ojedinelý prípad rezistencie (zníženého účinku na buriny) pri použití účinnej látky flumioxazin bol zistený u druhu *Ambrosia artemisiifolia* v sóji, USA, Delaware, 2005. Riziko vývoja rezistencie sa môže vzťahovať k monokultúram, kde sú používané herbicídy patriace podľa spôsobu účinku do jednej skupiny (inhibítorov enzýmu protoporphyrinogen oxidázy, protoxu, PPO). Na Slovensku do tejto skupiny patria prípravky s obsahom látok oxyfluorfen a bifenox. Dodržiavajte nasledujúce pravidlá antirezistenej stratégie: Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v

dávkach podľa etikety. Striedajte plodiny. Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku (podmienené striedaním plodín). Zredukujte minimalizáciu, ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie. Nepestujte v monokultúre. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetrovaného pozemku). V prípade výskytu burín podozrivých z rezistencie použite tank mix podľa registrovaného rozsahu použitia.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Výber následnej plodiny po plodine ošetrenej prípravkom PLEDGE® 50 WP nie je limitovaný (počas rozkladu účinnej látky flumioxazin je 20-30 dní).

Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty: ani kultúrne, ani prírodné.

V prípade zaorania ozimín nepestujte náhradné plodiny do nasledujúcej jesene.

Ak je potrebné zaorať jarné plodiny, nepestujte náhradné plodiny skôr ako o 4 mesiace.

Dodržaním odporúčaných metód aplikácie prípravku (nízky tlak postreku, malá výška postreku, bezveterné podmienky aplikácie, v prípade potreby použitie trysiek redukujúcich úlet postrekovej kvapaliny) by sa nemal vyskytnúť úlet postrekovej kvapaliny na susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Nie je známy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Potrebný počet vodorozpustných vreciek rozmiešajte v pomocnej nádobe s menším množstvom vody, tento homogénny roztok vlejte za stáleho miešania do nádoby postrekovača naplnenej do polovice požadovaného objemu vodou a pri stálom miešaní doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Zakázané je pri príprave TM zmesí miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustíte práškové prípravky, až potom vlejete tekuté. **Bezpodmienečne** dodržte zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používajte všetky časti pracovných ochranných prostriedkov.

V prípade registrovaných TM zmesí PLEDGE® 50 WP pridávajte ako prvý v poradí. **Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tank mixov v menšej nádobe pri správnom nariadení.** Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia! Použite dostatočné množstvo postrekovej kvapaliny (300-400 l. ha⁻¹), alebo výkonné postrekovacie zariadenie, aby bola pôda a ošetrované rastliny dokonale pokryté postrekovou kvapalinou. V prípade rosičov resp. postrekovačov pracujúcich s nižšími dávkami postrekovej kvapaliny je možné dávku adekvátne znížiť v zmysle technických parametrov a výkonov konkrétneho zariadenia. Postrek nepripravujte do zásoby, ale vystriekajte ho počas niekoľkých hodín.

Dodržujte predpísané dávkovanie a nepostrekujte počas horúčav alebo dažďa!

Miešateľnosť s ostatnými pesticídmi a hnojivami.

V slnečnici postemergentne sa PLEDGE® 50 WP nesmie aplikovať ako tank-mix, t.j. nesmie sa miešať so žiadnymi pesticídmi ani hnojivami.

V slnečnici postemergentne je možné aplikovať PLEDGE® 50 WP **iba samostatne!**

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a opakovane (min. 2×) vypláchnite vodou (vždy min. štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne čistiacim prípravkom AGROCLEAN®

LIQUID v súlade s návodom na jeho použitie. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových vôd!

1. Pri čistení postrekovača postupujte nasledovne:

- nariedte zvyšok postrekovej kvapaliny (najmenej 5-násobne) a obsah vystriekajte na predtým ošetrovanú plochu.
- vypláchnite dôkladne obsah nádrže (všetky steny) a postrekovača, vyčistite hadice a prídavné zariadenia objemom vody najmenej 10% kapacity nádrže. Obsah vystriekajte veľkou rýchlosťou na ošetrovanú plochu a vyprázdňte nádrž aj príslušenstvá.

2. Čistenie zvyškového prípravku s detergentom AGROCLEAN®LIQUID

- naplňte polovicu nádrže vodou. Pridajte AGROCLEAN®LIQUID v dávke odporúčanej distribútorom. Rozmiešajte tento v nádrži, doplňte nádrž vodou a nechajte stáť 2 hodiny. Potom tank úplne vyprázdňte.
- trysky a filtre osobitne umyte roztokom detergentu.
- Opláchnite nádrž čistou vodou a nechajte obehnuť asi 10% vody cez hadice a príslušenstvá. Vyprázdňte nádrž aj príslušenstvá. Opakujte oplachovanie do úplného vyčistenia.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dôkladne si pred použitím prípravku prečítajte návod na použitie! Používajte pri práci **ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv; pri príprave postreku používajte aj ochrannú zásteru z pogumovaného textilu**. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Zabráňte pri manipulácii postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Prípravok nie je horľavinou. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom, alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly, alebo kropením a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd. Postrekujte len za bezvetria, alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicínalného uhlia. **Nevyvolávajte zvracanie!**

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie!

Po nadýchaní: prerušte prácu, opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 10-15 min a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrovanie! Pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich vybrať a pokračovať vo vymývaní očí po dobu najmenej 15 min.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte postriekaný odev, zasiahnuté miesto umyte mydlom a vlažnou pitnou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku (na báze 50% flumioxazin - t.j. N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl) cyclohex-1-ene-1,2-dicarboximide) a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: **02- 54774 166**).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5-30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chrňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Doba použiteľnosti prípravku je, pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch, 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmie však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.