

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

## RANCONA<sup>®</sup> 15 ME

Tekuté fungicídne moridlo vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu (ME) k ošetrovaniu osiva pšenice ozimnej a pšenice jarnej proti mazľavej sneti hladkej a mazľavej sneti pšeničnej.

### ÚČINNÁ LÁTKA:

**Ipconazole** 15 g/l  
(1,42 % hm)

**Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:** ipconazole číslo CAS: 125225-28-7, tetrahydrofurfuryl alkohol, číslo CAS 97-99-4

### OZNAČENIE PRÍPRAVKU



GHS09

### Pozor

- H410** Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
**EUH401** Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
- P273** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  
**P391** Zozbierajte uniknutý produkt.  
**P501** Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním oprávnenej osobe.
- SP1** Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
- Z 4** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.
- Vt 5** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
- Vo 2** Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.
- V 3** Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
- Vč3** Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

**Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!**

**Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!**

**Uložte mimo dosahu zvierat!**

**Zákaz skrmovania moreného osiva hospodárskymi zvieratami a rybami!**

**PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!**

**Držiteľ autorizácie:** Arysta LifeScience Registrations Great Britain Limited  
 Brooklands Farm, Cheltenham Road  
 Evesham, Worcestershire WR11 2LS  
 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

**Číslo autorizácie ÚKSÚP:** **14-01-1411**

**Dátum výroby:** uvedené na obale  
**Číslo výrobnej šarže:** uvedené na obale  
**Balenie:** 1 l HDPE fľaša  
 5 l, 20 l HDPE kanister  
 100 l, 200 l HDPE sud  
 1 000 l kontajner (HDPE s kovovým rámom)

® - je registrovaná známka Arysta LifeScience

### **PÔSOBNIE PRÍPRAVKU**

Fungicídne moridlo RANCONA 15 ME obsahuje ipconazole, ktorý patrí do skupiny fungicídov inhibujúcich biosyntézu sterolov – DMI, SBI: trieda I). RANCONA 15 ME pôsobí ako systemický fungicíd inhibujúci klíčenie spor a blokujúci rast mycélia hubových patogénov.

### **NÁVOD NA POUŽITIE**

| Plodina                          | Účel použitia                                   | Dávka/t | Ochranná doba | Poznámka |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| pšenica ozimná,<br>pšenica jarná | mazľavá snet' hladká,<br>mazľavá snet' pšeničná | 1,0 l   | AT            |          |

### **TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA**

Moridlo RANCONA 15 ME je použiteľné vo všetkých typoch moričiek určených pre aplikáciu kvapalných moridiel. Prípravok vo formulácii mikroemulzie dobre priľne na osivo, a preto nie je potrebné pridávať inkrušťačné látky. Prípravok je možné aplikovať neriedený, ale rozriedením vodou sa môže zlepšiť pokrytie osiva.

Neošetrujte osivo, ktorého vlhkosť je vyššia ako 16 %.

Neaplikujte RANCONA 15 ME na poškodené, zlomené alebo naklíčené osivo.

Neodporúča sa miešať moridlo RANCONA 15 ME s inými moridlami.

### **INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMÝCH A NEPRIAMÝCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY**

Aj keď testovanie preukázalo, že RANCONA 15 ME nemá žiaden vplyv na životnosť ošetrovaného osiva, klíčivosť a vitalitu namoreného osiva, môžu byť nepriaznivo ovplyvnené podmienkami skladovania. Namorené osivo preskladnené do ďalšej sezóny by sa malo pred siatím preveriť na

klíčivost'. Spoločnosť Arysta LifeScience nepreberá zodpovednosť za hodnoty osivových parametrov preskladneného namoreného osiva.

### OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

V dobe tlače neboli spoločnosti Arysta LifeScience známe žiadne prípady rezistencie k prípravku RANCONA 15 ME. Nie je možné vylúčiť alebo predpokladať prípadný vývoj rezistencie pôvodcov chorôb voči prípravku RANCONA 15 ME. RANCONA 15 ME obsahuje ipconazole, ktorý patrí do skupiny fungicídov inhibítorov biosyntézy sterolu (DMI-fungicídy; SBI: trieda I). Účinok proti chorobám môže byť znížený v prípade, že dôjde k vývoju kmeňov húb rezistentných voči ipconazolu. Použitie RANCONA 15 ME by malo byť v súlade so stratégiou proti rozvoju rezistencie. Táto stratégia by mala zahŕňať následné foliárne ošetrovanie prípravkami s účinnou látkou, ktorá má odlišný mechanizmus účinku.

Maximálny počet aplikácií: 1x za rok.

### VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu pri dodržaní návodu na použitie.

### VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky, včely a dážďovky prijateľné.

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

### ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1. Po ukončení práce vypustíte zvyšky moriacej kvapaliny zo všetkých rozvodov a čerpadiel späť do predmiešacej nádoby alebo do originálneho obalu. Aplikčné zariadenie očistíte mechanicky oškrabaním od zvyškov osiva a iných usadenín. Pevné odpady odsajte priemyslovým vysávačom, pokiaľ je to možné. Rozvody kvapaliny, čerpadlá a trysku vypláchnite čistou vodou.
2. Zvyšok roztoku oplachovej vody vypustíte a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou.
3. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupovať podľa návodu na ich použitie.

### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev, ochranné rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumovú obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Vrecia od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely a musia byť zreteľne označené: **Pozor!**

**Osivo namorené prípravkom RANCONA 15 ME na báze ipconazolu! Zákaz skrmovania!**

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. /Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

## **PRVÁ POMOC**

**Pri náhodnom požití:** nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

**Po nadýchaní:** vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

**Po zasiahnutí očí:** vyplachujte oči prúdom pitnej vody po dobu najmenej 15 minút. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

**Po zasiahnutí pokožky:** zasiahnuté miesto umyte dostatočným množstvom vody a mydlom. Žiadne škodlivé účinky sa neočakávajú.

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02/ 54774166).

## **SKLADOVANIE**

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 - +30 °C, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

## **ZNEŠKODNENIE ZVÝŠKOV A OBALOV**

Nepoužitý zvyšok prípravku v pôvodnom obale a obaly od namoreného osiva zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3 krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál zneškodnite ako nebezpečný odpad.