


Herbicidní ochrana časně  
postemergentní • • • •

## Šetrná a spolehlivá herbicidní ochrana



# BUTISAN TOP

TOP řešení v preemergentní, ale hlavně i časně postemergentní herbicidní ochraně řepky

Povolené použití v ochranných pásmech II. stupně povrchových vod i na svažitých pozemcích

Ohleduplné ke vzcházející řepce díky kombinaci účinných látek metazachlor a quinmerac

Doporučené dávkování 1,75–2,0 l/ha

### Účinné látky

Metazachlor	375 g/l
Quinmerac	125 g/l

**Butisan Top** je herbicid do řepky ozimé určený jak pro preemergentní, ale i pro časně postemergentní aplikaci. Nejvyšší účinnosti přípravek dosahuje u klíčících jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů, nejpozději však ve fázi jejich děložních listů.



**Butisan Top** obsahuje dvě účinné látky s dvěma rozdílnými mechanismy účinku. Účinná látka metazachlor je přijímána zejména kořenovým systémem při vzcházení, kdy inhibuje klíčení a vzcházení. Druhá účinná látka v přípravku Butisan Top – quinmerac – je přijímána primárně kořeny plevelů a částečně také listy. Protože k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti jen při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Mezi citlivé plevely k přípravku Butisan Top patří zejména laskavec ohnutý, psárka polní, rmen rolní, ptačinec žabinec, svízel přítula, kolenec polní, hluchavka objímavá, hluchavka nachová, tetrucha kozí pysk, pomněnka rolní, starček obecný, chundelka metlice, heřmánek pravý, heřmánkovec přímořský nevonné, lipnice roční, kopřiva, nepatrneč rolní, mák vlní, kokoška pastuší tobolka, mléče ze semene, rozrazil perský, rozrazil břečťanolistý, rozrazil polní či rozrazil rolní.